

怎樣選擇產卵雞？



李登元

每年五至十月，產卵能力低的雞，大多停止產卵，在這時候淘汰產卵劣雞，最為適宜。

雞的產卵能力差異很大，為減低蛋的成本，必須選擇產卵能力強的雞飼養。

本省有不少成功的養雞者，並沒有新從國外買來好的雞種，而只是在本省現有的產卵雞裡，選擇產卵能力高的，淘汰產卵能力低的，慢慢地改良了雞群。由此也可知，淘汰與選擇雞隻，是養雞者非常重要的工作。

雞隻的淘汰，一年四季都可以舉行，可是，每年五至十月間，產卵能力低的雞，大多停止產卵，能力高的仍舊繼續生產，因而，比較容易發現劣雞，這時來淘汰劣雞，最為適宜。

一、好雞必備的五個條件

產卵能力高的雞，必須具備下列的五個條件：

(1) 早熟 產卵能力高的雞，較早生產第一個蛋。

(2) 產卵率高 用自動產卵箱，或籠飼的，可由記錄表知道那幾隻雞的產卵率較高。

沒有記錄可供參考時，可由雞的嘴喙及腳蹼的退色情形（指黃色皮膚的雞種）來斷定；退色快的產卵率就高。

(3) 無賴抱性 無賴抱性的才是理想的產卵雞。

(4) 產卵期長 好的產卵雞，產卵期長，在八、九及十月間，仍繼續產卵。

(5) 晚期換羽 產卵能力高的雞，在國曆八月十五日以後才換羽（在九、十或十一月換羽），換羽快，而且所需時間短，秋、冬季的休產期短。

二、從外形判斷好壞

產卵能力高的雞，與產卵能力低的雞，可以從雞體上某些部位的特點來分別，下面舉出幾種特徵的比較，以供參考。

部位	產卵能力高的雞	產卵能力低的雞
冠	紅，油潤，大而豐滿	小，萎縮，蒼白且有白癩
嘴喙	退為珠白色或正在退色	黃色，或漸變為黃色
眼	短，粗曲度適中	長而薄
眼	明亮，突出而有精神	陷下而無精神
眼	退為白色	黃色
眼	退為白色	有黃色點
耳	退為白色	黃色
趾骨	距離寬且薄軟	距離近（狹）而粗硬
腹部	深，柔軟	淺，粗而緊

肛門 濕，大且退為白色
羽毛 羽毛有破裂，且有泥穢附著

背部 寬，長而且直

深度 深

肋骨 長，拱出有彈性

頭 大，深，強壯

臉 清秀，潔淨，柔軟

皮膚 鬆軟，薄，而且柔軟

此外，從雞的健康及性情，也可以鑑定雞的好壞。產卵能力高的雞，都健康、活潑、友善，而產卵能力低的，都不健康、笨拙，而且粗野

農業小智識

▲同一品種的甘藷，製粉率又因塊根大小而不同。通常，小塊根所含的澱粉，比大塊根要多，而中塊根比大、小塊根都多，例如：「立四十日種」甘藷，大塊根含粉率為一六·四%，中塊根為一九·八%，小塊根為一八·一%。臺農四號，大塊根製粉率為一一·八%，中塊根為一三·五%，小塊根為一三·一%。（李良）

▲洋葱是不耐酸性的作物，土壤酸性愈強，生育愈不良。土壤「酸鹼度」如為「四」，生育幾乎停止，根部發育極壞，葉色變淡，自葉尖起向下黃枯，新葉葉筒中段褪色枯萎而折倒，心葉枯死。這種現象，在臺灣各地，甚至高冷地已看到很多，因此有些地區，洋葱種不成功。（郁宗雄）

▲柑桔的青黴病與綠黴病兩種病害，使柑果在運輸、貯藏中腐敗，引起很大的損失。這兩種病害，都是由青黴菌引起的。但是現在常用的「配尼西林」，却是從青黴菌提取的（劉和元）