



注意防治菸草夜盜蟲

郭·可·詒

蟲，如發現葉上附着有卵塊，應隨時摘除消滅。

夜盜蟲是爲害作物種類最多的一種害蟲，菸草也受它爲害。

夜盜蟲的成蟲在菸苗的葉背產卵，約經三日左右

，孵化爲幼蟲。初齡幼蟲，在葉上成群，蠶食葉肉，只留葉子另一面的表皮膜。到三齡以後，分離四散，晝伏夜出，擴大爲害，被害嚴重的菸苗，只剩葉脈，並且會侵入本圃，繼續爲害。種菸的季節快到了，請菸農們依照下列的幾點，來防治夜盜蟲。

一、苗床要遠離菜園

大多數蔬菜（如蘿蔔、白菜、菠菜、苣荬菜、甘藍、花椰菜、葱、番茄以及瓜類等），都是夜盜蟲所喜歡吃的。假如苗床設在菜園的附近，菜園中的夜盜蟲，很容易爬到苗床來，爲害菸苗。所以，菸苗苗床，一定要遠離菜園。

二、清除苗床附近的雜草

夜盜蟲是雜食性的昆蟲，很多種草本植物，都是牠的寄主，所以，苗床附近的雜草，要加以清除，以減少夜盜蟲的棲息場所。

三、捕殺幼蟲及卵塊

在清晨或陰天的時候，常常巡視苗床，捕殺幼

四、藥劑防治

(1) 有效的三種藥劑 防治夜盜蟲的藥劑很多，其中，以十% DDT 粉劑，或二百五十倍的二十五% DDT 乳劑稀釋液，較爲經濟有效。使用「安特靈」乳劑的五百至七百五十倍稀釋液，效果也很好。

(2) 施藥的方法 ①在播種後二十天左右，行第一次施藥（因爲苗

床夜盜蟲幼蟲，大部是由成蟲產卵葉上孵化而來，如菸葉太小，成蟲是無法棲於葉上產卵的。）

②以後，每隔一星期施藥一次，可以預防苗床害蟲的發生。

③爲節省藥劑起見，可以只在被害的區域施

藥，但是，在移植以前，無論有蟲無蟲，都要全面施藥一次，以免將害蟲帶入本圃。

④在噴藥之前，苗床要充分澆水，在日落傍



夜盜蟲幼蟲

晚時施藥（因爲夜盜蟲是在夜間出來食害葉的）。如非必要，第二天應停止澆水一日，以免將藥劑沖去

⑤施藥當晚遇雨，第二天應再施藥一次。

五、注意農藥中毒！

「安特靈」的毒力很強，在用開應用時，如濃度較高，應避免污染衣服或直接與皮膚接觸，噴佈時切不可吸入噴出的霧滴。

無論 DDT 粉劑、乳劑，或「安特靈」乳劑，施用完畢後，應立刻用肥皂水洗手足，並更換衣服，以策安全。

註：夜盜蟲會爲害柑橘、葱、蔬菜、落花生、田菁、茶樹、甘藷、薄荷、煙草等作物。民國四十四年四月，本省南部旱田作物，曾經發生過嚴重的夜盜蟲災害。

榨菜

栽培

問答

一雄宗郁一

問：請問榨菜的栽種適期，採收時期，及銷路情形各如何？又，在苗栗地區，可否自己採種？（苗栗縣公館鄉黃蘭火）

答：①播種適期北部九至十一月，中部九至十二月，即和大心芥菜的播種期相同；苗期一個月後定植到本田。

②栽培榨菜主要目的，在肥大的莖部加工工作榨菜，所以最好先和榨菜加工廠作契約栽培。定植後三個月可以收穫，以莖部已肥大且葉腋間瘤狀突起物已發達，莖肉尚未變老時爲適收期。整株沿地際頸根部割取後剝去葉片，挑到加工廠加工製造，或挑到市場上仿照大心芥菜出售，供煮炒食用；葉片較粗，可加工醃製酸菜。

③榨菜在臺灣採種有困難，尤以南部爲甚，須利用高冷地採種。