

# 農業信箱

## 鳳梨粉介殼蟲凋萎病

### 必須及早噴藥防治

問：我的鳳梨，種在山地，土地肥沃，發育良好，每年除草兩次，但沒有施肥。在三、四月間，發現葉子枯黃而有黑點，根部少有腐爛，但頭部有青蟲（好像油蟲），在向南的地方，尤其厲害。請問病因及其防治方法。（高雄縣燕巢鄉董長賢）

答：據來信所述，好像鳳梨粉介殼蟲凋萎病。由於粉介殼蟲侵害鳳梨莖葉時所吐出的毒素，破壞了莖的通導組織，因而使葉片變黃，現出枯萎現象。

粉介殼蟲橢圓形，像一粒芝麻大小，大的比米粒略小，身體柔軟，體外有一層白粉，就是你所說好像油蟲的東西。

防治此病須趁早。已現嚴重凋萎現象的植株，已無法救治。同時粉介殼蟲由螞蟻搬移，自病株搬至健全株，所以此病蔓延迅速。防治此病須殺死粉介殼蟲及螞蟻，用五百至一千倍馬拉松乳劑溶液灌注注葉中或噴佈一星期一次，連續二、三次，同時噴佈「安特靈」或「地特靈」三百倍液於植株及株行間地面，一月一次，噴二次。（蔡致讓）

### BHC乳劑何處有售？

問：請問何處有售BHC乳劑？（屏東縣萬丹鄉邱緒祥）

答：高雄市成功二路農業化工廠有售BHC 10%乳劑，每公升四十三元。（陶家駒）

### 秋季栽培胡瓜的適期到了

問：①栽培刺瓜那一月最適宜？②甚麼土質最適宜？③栽培要點如何？④蟲害有幾

農業信箱信件，請在信封上寫「農問」二字，及詳細地址，以便迅速處理。

種，防治方法如何？⑥每公頃平均收量有多少？⑦瓜種有幾種，最優良種子何處有售？（臺南縣南化鄉羅國年）

答：①胡瓜（刺瓜）一月至四月及七月至十月可播種栽培，但最適宜的播種期為春季二月下旬及秋季九月下旬。

②只要澆水方便，排水良好，無論砂質或粘質壤土，都適於栽培胡瓜。③胡瓜栽培要點如下：  
 ①栽培地應多施基肥（堆肥、人糞肥、硫酸鉀、過磷酸鈣等）。  
 ②發芽後應注意一

## 了貨進子種菜蔬良優國美、本日

### ◎草菇種菌 十瓶

- △長岡交配一號甘藍 一兩價格 九五元
- △長岡交配二號白菜 四五元
- △長岡交配理想白菜 四五元
- △長岡交配四元白菜 四五元
- △交配完全結球白菜 六〇元
- △三池中生甘藍 九元
- △三年子成功中生甘藍 九元
- △金澤紅頭菜 三〇元
- △彰浦中生包心白菜 三〇元
- △臺灣早生花椰菜 三五元
- △臺灣中生白晶花菜 三五元
- △金門早生大結頭菜 二五元
- △美國紫玉早結頭菜 一三元
- △美國紅心五寸人參 一〇五元
- △美國豐肉六寸人參 一〇五元
- △美國長形五寸人參 一〇五元
- △京都三號結球白菜 一五元
- △特選黃金白菜 一五元
- △八十天油菜 二〇元
- △丸葉山東菜 二八元
- △花心白菜 三〇元
- △半結球山東菜 三〇元
- △冬瓜白長菜頭 一六元

寄即索函表目價有均子種外內省種各他其  
 司公材資業農灣臺 理代總灣臺  
 號九九七二一撥劃政郵 號六八一段一衙化迪市北臺

瓜守」為害。③追肥用人糞尿和過磷酸鈣行二至三次，並須在結果前全部施完。④開花期注意澆水（土壤過乾過濕都容易患病）。⑤採收期宜早不宜遲，果實應在開花後十五日內採收。  
 ④主要蟲害有蚜蟲和瓜守，前者用魚藤精或馬拉松乳劑驅除，後者用砒酸鉛就可防除。病害有露菌病，炭疽病，白粉病，蔓枯病，病毒病等。露菌病，炭疽病，蔓枯病等用大生水和劑四〇〇倍，白粉病用可利生一五〇〇倍撒布防除。病毒病應徹底驅除害蟲預防傳染。

⑤每公頃平均產量約一萬五千至二萬公斤左右。  
 ⑥春夏季栽培品種，以臺中目瓜，秋季栽培品種，以桶榨黑刺胡瓜最好。南部鳳山鎮第二市場一四八號農友種苗店，中部臺中市第二市場信昌農產行，北部臺北縣三重鎮重新路與農種子行都有優良種子出售。（陳文郁）

問：我種水梨已三年，今年四月間，忽發現梨葉上有病狀。過了兩星期，害病部

### 怎樣防治水梨的赤星病？

一觸必死、萬蟲有效

## 素のスキラモ！

不但可以製造殺蚊水又可以製造蚊香

**一、殺蚊液**

使用法說明  
請用モスキラーの素

每一罐請如左使用

被殺四十五  
石油中，製  
成十打粉殺  
蚊水。

**二、蚊香**

使用時請倒立

每五坪地盤  
內請用三分  
鐘（含社製  
明香內請三  
坪地使用一  
包香請請  
訂正）

氣味芬芳、人畜無害

一罐三〇〇元裝，定價二〇〇元 七九月特價一〇元

## 無比的效能

### 如夢的清香

日本大同除蟲菊K K製 一罐一兩 文化工業社 臺北中區  
街一〇八號

說明書樣品備索，每包四元五角寄款來即寄，購者請郵匯或以可交換之支票

繼續徵求地方經銷商，公務員最好之家庭副業，詳細請看12-15期本報