

生衛的後前產生畜家



季 培 元

一、生產前的衛生

- (1) 清潔的畜舍 畜舍要寬廣明亮，數糞要充分，能保暖。地面不要傾斜或凹凸不平，尤其是乳牛，如後軀低下，易患脫腔症。牲畜後軀清涼易致流產，糞草保持清潔，避免母畜橫臥。
- (2) 適當的運動 妊娠家畜，要有適當的運動。放牧最好，假如不能放牧，可使於運動場行一定時間的自由運動、日光浴，或一至二小時的牽引運動。妊娠後半期，應減輕使役工作，特別是疾走，過重的鞭曳，及壓迫腹部的工作，都應該避免。
- (3) 注意氣候的變化 急變的氣溫，如突遭

寒冷，易患流產。妊娠家畜應禁止水浴，或用冷水洗滌。注意放牧時遭受暴風雨及驟寒的侵襲。

(4) 乳房的衛生 擠乳中的乳牛，在分娩前一至二月減少擠乳次數，擠乳量順序減少，濃厚飼料漸漸少給。

初妊娠家畜用微溫湯輕輕按摩乳房，以使習慣。初產時常感乳汁不足，可在妊娠期間輕施刺激，促使乳房的發達，但不可過度的刺激。

(5) 避免外界的刺激 驚愕與興奮等，對母畜有害，應予避免。嚴禁其他動物，如犬等的擾亂及侵襲。

(6) 營養的飼料 妊娠母畜，要給容易消化而富營養的飼料，尤其在妊娠中期，應避免給粗飼料。其他，如酸酵性飼料、冷凍飼料等，可引起下痢而致流產的，也不可給與。飲水要保持清潔，微溫後給與。常注意有無便秘，如有便秘，應速治療。

飼料中應富含蛋白質與礦物質，尤其是鈣和磷的供給，更為重要，此外，維他命的供應也要注意。

(7) 禁忌的藥物 峻下劑常會引起流產，哥羅仿及水化氯醛等麻醉藥對胎兒直接有害，都應避免。

二、生產後的衛生

(1) 母畜分娩後，給麥麸溫湯，或給少量麥酒，必要時，再給強心劑。

(2) 注意產後疲勞或產道損傷等，如產道太損傷，須注意其他感染性疾病，乳房炎，產褥熱，子宮脫等病。

(3) 時常更換產褥，消毒外陰部與陰部。

(4) 畜舍要保持乾燥，多敷乾草，保暖，嚴防賊風侵襲。乳房、內腹部與下腹部，洗淨後拭乾。乳頭也要注意清潔。

(5) 給與富營養，易消化，容積較大的飼料。以後漸次給與普通飼料。小家畜分娩後給二至三枚卵黃與容易消化的軟性飼料。可能時，給牛乳飲用最好。

三、如何保護初生兒

(1) 初生兒應即行皮膚摩擦，拭乾皮膚粘液，預防着涼。口或鼻腔內的粘液，要設法除去，以防窒息致死。

(2) 臍帶在生後約一星期乾燥脫離，初生臍帶宜用碘酊或紅汞水塗布，以防感染病菌。

(3) 胎兒便在生後數小時排出，如不排出，須趕緊設法通便，以免危險。

(4) 初乳要充分給初生兒飲食，初乳不但營養豐富，還可以促進初生兒胎兒便排出，並可增加初生兒抵抗疾病的能力。

五、怎樣收藏？

到了農閑期，「引擎」要長期收藏。這時請注意下列的幾點：

(1) 放空燃料箱內的汽油。

(2) 由火星塞穴注入少量（約十立方公分）機油，然後用手轉動數回，把火星塞裝回，再用手轉到壓縮之點，停止（預防氣缸、活塞、活塞環，及氣瓣在收藏期間生鏽膠着）。

(3) 曲軸箱及空氣濾清器內的機油，全部排出，清除塵砂後，加入新機油。

(4) 用油布拭淨「引擎」外面，以防生鏽。

(5) 選擇通風良好，塵埃、濕氣較少，並且不受風雨吹打的場所收藏。

養保的「引擎」油汽

(頁九第接上)