

的培栽作裏於適

豆大石十

— 慶文劉 —

高雄區農林改良場，繼「百美豆」推廣成功，又選出一個大豆早熟品種「十石」。據該場在屏東地區試作的結果，十石的生育日數，春播為八十四日，夏播為一百零二日，秋播為八十一日，每公頃產量一千二百至一千八百公斤。

「十石」的產量雖不及「百美豆」，但是具有早熟的優點，適宜於短期或冬季水田裏作（糊仔）栽培，所以，試作後頗受一般農民的歡迎，本年夏作屏東縣試作面積就有三十餘公頃之多，據說，臺中縣今年冬季將正式推廣這大豆品種，其他地區的農友們，如想要試種「十石」大豆，可向屏東市民生路高雄區農林改良場洽取種子。

播種的適期 屏東高雄兩地區栽培「十石」大豆的播種適期，春播為二月中旬至三月上旬，夏播為六月中旬至六月下旬，秋播為九月下旬至十月上旬。

密植可以提高產量 「十石」大豆是矮生品種，因為過去栽培的株行距過寬（二十×五十公分），影響單位面積的產量，以後，如將株行距縮小（密植），產量當可以提高。

播種法以點播為宜。播種深度約二至四公分；乾旱季節宜深播，雨季宜淺播。

每公頃播種量四十至五十公斤（種粒大，播量較多）。株行距因季節而不同，春播或夏播以距以四十至四十五公分為宜，秋播以四十公分為宜。春播或夏播之株距以十五公分為宜，秋播以十公分為宜。發芽後兩星期左右，如植株過密，應行間苗。

發芽前絕不可灌水

因為「十石」大豆的種皮很薄，不耐水，播種後在未發芽以前，切



（十石大豆）



有連環不圖會自執狂
有時性命續滅亡

賴萬文
壬酉圖

，返子待母父裏匿
，問界四子小無待
，（望）騰無驚惱煩家一
。問查抖警報法無

，狂起續味趣然突
，中裏往母父報無
，爽真講圖看車坐
。雄高到車火完看

，歲二十年今玉阿
，會賢擱明聰資天
，背不格冊書當正
。畫圖的環連專

勿灌水，如灌水，種子容易腐爛，影響發芽。

又如播種後至發芽前遇雨，土面硬結，使發芽困難時，可用小型鐵耙將硬結成層的土面輕輕耙鬆，以助幼芽出土。

怎樣施肥

「十石」大豆較「百美豆」耐肥，每公頃施堆肥八千至一萬二千公斤，過磷酸鈣二百至二百五十公斤，硫酸鉀一百至一百五十公斤。如酸性土壤，應加施消石灰二百至三百公斤。

秋作「十石」，生長不及春作或夏作迅速，為促進生長，在生育初期，應施用少量氮素肥料（每公頃施硫酸銨四十至六十公斤）作追肥。

提早中耕除草

「十石」是早熟品種，中耕、除草與培土，都應提早實施。發芽後兩星期內，行第一次中耕除草，直至開花以前，再行中耕除草一次。中耕除草時，同時培土，將條間兩側的土壤，向植株間培土。培土高度，以六至十公分為宜。

灌溉與排水

在生育期間，平常不需灌水。如天氣乾旱，土壤過度乾燥時，才需灌水，使土壤保持濕潤。灌水時，以土壤濕潤為度，不可使田間積水。如遇下雨，應注意排水，以免田間積水，影響大豆根部腐爛。

害蟲防治

本省大豆主要害蟲有：大豆潛莖蠅、大豆蛀心蠅、大豆潛根蠅、大豆潛葉蠅、大豆莢癭蠅、黑夜盜蟲、青椿象、黑跳盲椿象、細緣椿象、白緣螟蛾、豆潛葉細蛾、蚜蟲、黃毒蛾、大蟋蟀等。為減少蟲害的損失，必須注意害蟲的防治。

大豆生育期中，無論蟲害發生與否，均須噴藥預防。噴藥次數最少四次：

第一次於播種後本葉展開時（夏作播種後七天左右，春、秋作播種後十四日左右），噴「安特靈」乳劑一千倍液。


第二次於第一次噴藥後二十日，噴「安特靈」乳劑一千倍液。

第三次於大豆大部份花落後，噴「安特靈」乳劑八百至一千倍液。


第四次於豆莢開始膨大時，噴「安特靈」乳劑八百至一千倍液。

如栽培地有螻蛄，播種時應撒佈少量「地特靈」或 Heptachlor 粉劑在種子附近。又如栽培地有蟋蟀，播種前（即整地後圍上無雜草及其他作物時）撒佈毒餌（毒餌調製法為：米糠一磅加「地特靈」或 25% Heptachlor 可濕性粉劑五公分，充分混合後加水，使粉結成團為度），每公頃施用十公斤左右。

註：一磅大約等於四百五十公分。



（距行株的播秋）



，講實照啊尾玉阿
，狂熱的圖環看為
，攔阻愛母父人做
，枉冤着事有無若

，害被說語巧言花
，來騙拐藥迷花採
，界世的學科講警
，代款此影有裏那

，開好可錢無玉阿
，（去去來來）來往的頭車在帶
，內所帶疑嫌察警
，來裏那底到伊問