

而且光滑的木棍上，將兔皮來回磨擦至柔軟為止。最後可以擦上滑石和樟腦來防腐，並且增加美觀。

(2) 鹽酸硝製法

① 浸皮：將剛剝下來的皮毛，放入陶器內，用比例為食鹽一斤，硫酸半兩，水五斤的溶液，浸二至三天，每天攪動三到五次。

② 水洗：浸好取出，用清水洗滌乾淨。


③ 再浸：在硼砂水中浸約十分鐘（硼砂水調合比例為：硼砂一兩，水五斤），然後取出，用清水洗滌乾淨。

④ 釘板：方法如前。

⑤ 塗油：方法如前。

⑥ 打磨：方法如前。

以上二種製法，方法簡單，最慢在一個星期內就可以做好柔軟美觀的家兔毛皮。普通明礬硝酸法比鹽酸硝製法常用，而且絕對有成功的把握。



(糖試所用人工飼料培養螟蟲試驗)

△農業小知識▽

▲為害本省甘蔗的螟蟲，共有五種，即是黃色螟蟲、二點螟蟲、條螟蟲、白螟蟲、紫螟蟲。

▲螟蟲的人工培養，頗為困難。上面的照片，是臺南糖業試驗所，用人工飼料培養螟蟲的試驗。

▲甘蔗幼苗的心葉，逐漸乾燥變黃而枯萎，心葉以外的蔗葉看上去却仍是綠色的，就叫做「枯心」。

▲甘蔗發生枯心，並不一定全是螟蟲為害的結果，如金針蟲、蔗龜、蠅蚧、白蟻等害蟲，都可以使甘蔗發生枯心。

▲成長蔗莖的梢頭部份受白螟蟲為害，也會發生枯心的現象，梢頭部枯死後，側芽萌發生長。幾個側芽同時萌發，外觀就像是掃帚一樣。


▲為害甘蔗的五種螟蟲，產下的卵都不一樣。除黃色螟蟲以外，都是排成卵塊。卵塊的排列方法各不相同，專家們一看就知道是那一種螟蟲產的卵。



④ 阿福一時真喜歡，農藥當做食物，農將蓋開來，就將農藥毒落去。(不)知有毒食落去。



⑤ 阿勇某冠(夫)某返時，阿福在倒桌腳邊，父母看見(速)緊抱去，可已借經死毒。



⑥ 農藥有毒(小)字(細)着，着寫明(要)真(意)着，(不)可(亂)放桌腳邊，若無誤食(子)害。