五、間拔

雙葉（子葉）展開後開始間拔，但須注意不可動搖其他的苗株。間拔次序如下表（表二）。

六、病蟲害的防治

病蟲害應注意預防，不可等到發生才防治。

（1）本葉展開後開始，每隔七天噴射四百至五百倍大生液一次，預防露菌病及黑斑病發生。

（2）心蛀蟲、青蟲、蚜蟲、黃條虱蟲及蟋蟀，可用馬拉松一千五百倍液或DDT乳劑一千倍液防治。爲預防蟲害發生，可於第一次噴射大生液時加進馬拉松一起噴射。

七、移植

（1）播種後十四至二十天就可移植到本圃。

（2）移植前一天，充分灌水，使每一小方塊都滲透水分，以防止取苗時土塊崩解或切斷根部。

（3）採苗時，用「秧銚」最方便，菜苗連土塊移植到本圃。

表二：間拔次序

次數	播種後日數	生育狀態	間拔株數	備註
第一次	四—五	子葉已充分展開	一株	假如育苗日數爲十三天，每一苗小方塊留一株，育苗日數爲十五天，每一小方塊留二株，時天時，每一小方塊留一株，定植於本圃。
第二次	一〇—一二	第二枚本葉展開	二株	
第三次	一五—二〇	本葉四—五枚	三—四株	

如何選購洋菇菌種

——米明琳——

因爲前年有些農友種洋菇賺了錢，去年的洋菇栽培熱，可說盛極了一時。然而，因爲種的人多，價錢也就從每臺斤二十元幾，一落落到了五、六元，據說有人因此而虧了本。

生產過剩固然會使栽培洋菇的利益減低，但是不一定引起虧本。在去年的洋菇盛產期，品質好的洋菇，依然能賣到十元一臺斤，就是個值得大家注意的事情。

從去年栽培洋菇虧本的例子中，我們可以發現他們的栽培法有很多不合理的地方。例如：使用不良種菌，栽培環境不適宜，設備不足，管理不週等。因此，種出來的洋菇，品質既不好，產量也很低。拿這樣的洋菇，在市場上與別人的競爭，當然就要虧本了。

今年栽培洋菇的季節就要到了，有意種植的農友，希望能在栽培技術方面先做改進，種出成本低，品質好的洋菇。有優良的菌種，才能希望洋菇豐收。這裡先告訴你怎樣選購優良的洋菇菌種。

洋菇的菌種有三種：①馬糞菌種，②穀粒類菌種，③煙草莖菌種。但是本省市場上所賣的，大多是馬糞菌種（實際上是用家畜廐肥混和一些草藁類爲原料製成的）。購買馬糞菌種時，請注意下列幾點。

①馬糞菌種的培養基是黑色的，菌絲生長在培養基上。假如菌絲緻密，白色而有光澤，就是强健的菌種。

②如果菌絲已變黃，而且菌絲形成絲條狀——好像綿線般稀疏零碎地分佈着，取出內部剖視，只可看到少量的菌絲，這種菌種就是不好的。

③菌種的純度也可以用肉眼看出。不純的菌種，常可發現綠色、褐色、黃色，及紅色等斑點。這種不純的菌種，絕不可購買。

④瓶裝菌種，應有一定規格的重量，通常一磅裝的菌種，可供一坪地之用，所以菌種的鬆緊，也要注意。

新穀寶洋菇菌種出現了!!

新穀寶洋菇菌種的特點：
①顆粒形播種（條撒）簡便。
②水份與營養份含量比普通菌種多。
③菌絲量多，生機旺盛特强。
④生長迅速，收穫早，產量高。
⑤每瓶可播種兩坪面積。

每瓶（五百cc）二元五十元，十月中旬售出

興農優良蔬菜種子

△美國原封罐裝胡蘿蔔每磅一〇元
△省裝每磅入荳及各種甜椒及各種甜菜每磅一元
△結球萵苣入加洲大甜嫩萵苣每磅一元
△長岡交配二號白菜（理想白菜）
△長岡交配心白菜（アスベラガス）
△特選卷心甘藍每兩七十二元。
△興農晚生巨大花椰菜（美國）
△四川榨菜（最可靠之品種）
△興農大梅花（每株常穫兩三臺斤）
△馬鈴薯催芽劑
△ナイロン製カスミ網。
△其他各項種子及農藥，優秀農園懇新知識」
新品種之介紹及栽培說明請參看「興農園發新知識」
自即日起至十月底止。免費贈閱兩星期函索請用明信片，信到即寄。

◉購郵局郵用利請◉
重三縣北臺
鎮一路新一段四八號
興農種子行
郵政劃撥
電話四三五三二〇八二號