

雙葉（子葉）展開後開始間拔，但須注意不可動搖其他的苗株。間拔次序如下表（表二）。

病蟲害應注意預防，不可等到發生才防治。

(1) 本葉展開後開始，每隔七天噴射四百至五百倍大生液一次，預防露菌病及黑斑病發生。

(2) 心蛀蟲、青蟲、蚜蟲、黃條虱蟲及蟋蟀，可用馬拉松一千五百倍液或DDT乳劑一千倍液防治。爲預防蟲害發生，可於第一次噴射大生液時加進馬拉松一起噴射。

- (1) 播種後十四至二十天就可移植到本圃。
- (2) 移植前一天，充分灌水，使每一小方塊都滲透水分，以防止取苗時土塊崩解或切斷根部。
- (3) 採苗時，用「秧鉤」最方便，菜苗連土塊移植到本圃。

表二：間拔次序

次數	播種後 日數	生育狀態	間拔 株數	備註
第一次	四—五	子葉已充分 展開	一株	爲十塊，假 如育苗日 數爲十五 天，每一小 方塊留一 株，育苗日 數爲五天， 每一小方塊 留二株，每 一小時每一 方塊留一 株，定植於 本圃。
第二次	二—二	第二枚本葉 展開	二株	
第三次	一五—二〇	本葉四—五枚	三—四株	

——琳 明 米——

好，產量也很低。拿這樣的洋菇，在市場上與別人的競爭，當然就要虧本了。今年栽培洋菇的季節就要到了，有意種植的農友，希望能在栽培技術方面先做改進，種出成本低，品質好的洋菇。有優良的菌種，才能希望洋菇豐收。這裡先告訴你怎樣選購優良的洋菇菌種。

洋菇的菌種有三種：①馬糞菌種，②穀粒類菌種，③煙草莖菌種。但是本省市場上所賣的，大多是馬糞菌種（實際上是用家畜廐肥混和一些草藁類為原料製成的）。購買馬糞菌種時，請注意下列幾點。

①馬糞菌種的培養基是黑色的，菌絲生長在培養基上。假如菌絲緻密，白色而有光澤，就是強健的菌種。

②如果菌絲已變黃，而且菌絲形成絲條狀——好像綿線般稀疏零碎地分佈着，取出內部剖視，只可看到少量的菌絲，這種菌種就是不好的。

色，及紅色等斑點。這種不純的菌種，絕不可購買。

④ 瓶裝菌種，應有一定規格的重量，通常一磅裝的菌種，可供一坪地之用，所以菌種的鬆緊，也要注意。

新穀實洋菇菌種出現!!!

①團粒形播種(條撒)簡便。
②水份與營養份含量比普通。
③菌絲量多，生機旺盛特異。
④生長迅速，收穫早，產量

新穀實洋菇菌種出現!!!

①團粒形播種(條撒)簡便。
②水份與營養份含量比普通。
③菌絲量多，生機旺盛特異。
④生長迅速，收穫早，產量

⑤ 每瓶可播種兩坪面積。

(cc百五) 瓶每
中月十，元五二
售出旬

△美國原封罐裝茄羅莖每箱一百一十元
△美國原封入土茄○
種，結球萬箇。△加洲大甜椒及各種胡
椒。△長筒安配二號白菜，理短白菜
△蘆筍(アスパラガス) △長筒白菜
一號甘藍每兩七十二元。△特選卷心
刈菜。△奧德施生巨大椰菜(美國)
△四川牌菜(最可靠之品種)
△興農大棉花(每樣常熟兩三萬斤)
△鈴鈴薯蕃根。△ナイロ製力菜
△米穀其他各項種子及農業、傢私等
新產品之介紹及栽培說明請參看「知
農園藝新知識」(興農堂附贈兩是
自即日起至月底止。免費索閱兩是
期函索請用明信片，信到即寄。

號八四段一路新重鎮重三縣北臺
行子種農興
號八二〇四撥劃政郵
號二三三五四話電