

害人的薑片蟲

· 撰 存 ·

據報載，

最近醫學專家們調查的結果，已證實在本省南部一帶，正流行着薑片蟲病，尤以臺南縣新營鎮，柳營鄉附近的鄉村中病情較重。因為這種寄生蟲病，對人體健康的危害甚大，故特將此病簡單介紹於下，以供農友們作為預防傳染或求醫診治的參考。


寄生在

小腸上部

薑片蟲的

長度，約有三

公分左右，是一種體形扁薄，有點像薑片狀的腸內寄生蟲，牠有一個簡單的口，和一個明顯的吸盤。通常都寄生在小腸上部；但偶而也會潛伏在胃和大腸內。由於牠能用吸盤，緊緊地吸牢在腸粘膜上，所以在糞便中，很難發現成蟲的存在。然而牠的蟲卵，却經常地隨糞便排泄出來，並且蟲卵的數量極多，據估計，一條成蟲，每天可排出二萬五千個蟲卵，因此檢查大便中有無蟲卵存在，便成為醫生診斷此病最可靠



的方法了。

吸取腸內營養

薑片蟲寄生在小腸內，直接吸取腸內的營養物為生，久而久之，便使人體陷於營養不良的狀態，發生貧血和水腫等症狀。同時在牠所吸著的腸粘膜上，還容易招致局部發炎。亦可能侵犯小腸壁的毛細管，使發生膿疱或流血。如寄生的薑片蟲數量過多時，還常導致腸阻塞，使人體發生中毒的症狀。

逐漸加重的症狀

一般說來，在招受傳染至三十餘日後，就開始出現腹部不適，嘔心，腹瀉及貧血等症狀，這些病狀逐漸加重，腹痛

也時常發生。大約經過三、五個月後，便發生臉部及下肢浮腫的現象，在原來身體衰弱或營養不良的人，受到較重的傳染後，可能在早期就出現浮腫症狀。兒童患此病後，腹部常呈明顯的膨脹而突出，如拖延日久，很可能因極度衰弱而告死亡。

以上所說的種種病狀，雖然並不能完全用來作為本病的診斷，但在流行此病的地區，以及會生吃過荸薺、菱角的人，却應懷疑到有患此病的可能。

預防的方法

性，最好及早去請醫生檢查大便，以求得確實可靠的診療。
遵醫指示服藥
在治療方面，自然應請醫診治，嚴格遵從醫生的指示，服用驅蟲劑。經過早期治療後，病人大多可以迅速康復，但對於會發生水腫的患者，則需有長期良好的調養，才能完全恢復健康。

體排出後，孵化成幼蟲，在河水中自由游泳，一有機會便進入它的第一寄主螺螄體內，而後便附着在水生植物如菱角、茭白、荸薺上，最後再乘機入人的胃腸內，發育為成蟲。所以不吃螺螄，是消滅病源的根源辦法。此外要注意蔬菜應煮熟，不宜生吃（尤其是水生蔬菜）；在水池中採取植物後，一定要洗手；菜刀切菜後要用開水沖洗乾淨；人及豬糞必須注意消毒，腐熟（約三個月）後才能應用作肥料。

食物不要嚼給嬰兒吃

思 萍

在孩子斷了奶，還不能自己獨立吃東西的時候，有些母親們，便先將食物在自己嘴裡嚼碎，再嘴對嘴地給食物喂給小孩子吃。這雖然表現出了母愛的偉大，但從衛生觀點看來，却是不值得讚美的。

簡單，你只要想法把食物搗碎就行。硬一點的水菓蔬菜要如此，麵包餅干，甚至米飯也要如此。如果你想給他點肉吃，最好要煮得很嫩嫩的，或是剝碎的（最好是肉汁）。如果是魚肉，雞肉等，那末一定要把裡面的骨頭取出來。

要知道，大人和小孩子對疾病的抵抗力不同，大人的抵抗力較強。同樣的病菌，在大人身體裡沒有什麼了不起，但進入小孩子體內，却可能非常危險，以嘴喂食，很容易地把疾病傳染給小孩子。舉例來說，傷風，肺結核，咽喉炎，扁桃腺炎等呼吸道的疾病，便都會經此傳染給小寶實，使你一片愛他的心，凡而變成害他。所以聰明的媽媽們，是不願這樣作的。那麼，究竟應當怎樣幫助他呢？說來也很

最後，須要請作媽媽的注意的，是一定要將搗食物用的器具，在每次用過以後，切實洗乾淨，並妥為保管。要不然，這上面滿藏了細菌，比用嘴喂給他吃還要危險呢。

