



你想栽培四川芥菜嗎？

陳培昌

四川芥菜除了製造四川榨

菜外，又可醃製鹹菜。因為它

適於本省中北部冬季裡作栽培

，已逐漸普通成爲新興的蔬菜

。今年的播種適期已經到了，新竹區農林改良場備有少量種子，有興趣的農友可以直接寫信去索取。

一、播種的適期

四川芥菜不喜歡高溫乾燥的氣候，所以只適於本省中北部栽培，南部不適栽培。

四川芥菜的播種適期，是十一月上旬。遲播莢瘠形成得小，又容易抽苔減收。發芽日數三日，每十公畝地（一分地）需要種子約三十公分。大規模栽培時應隔三日播種一次，以調節苗齡，更需與加工業者事前連繫。

二、育苗應注意的三點

苗床大小與栽培普通芥菜（刈菜）時相同，床土混拌腐熟堆肥後播種。播種後覆土，輕壓，再覆蓋稻草，每日澆水。發芽後除去覆草。多人栽培時，可以採用共同育苗，集中管理。育苗時，應注意下列三點，才能育成優良茶苗。

(1) 疏播 四川芥菜種子細小，應疏播。密播時要多費勞力，容易徒長，種子也不經濟。

(2) 間拔 四川芥菜容易與其他芥菜類雜交，因此，子葉一展開就要拔除畸形苗。第一本葉長出時，淘汰葉色過濃與淡黃的苗株，每九平方公分

留一株，以免苗株徒長。寬九十公分，長五公尺的苗床，可育成十公畝地（一分地）用苗。

(3) 防治害蟲 苗床期很容易發生菜螟等害蟲。本葉長出時，立即撒佈「安特靈」五百倍液防治。第十五日再撒佈一次以期安全。此時並施百分之二硫酸水，以促進生長，準備移植。

三、什麼時候移植？

四川芥菜的根群淺，須選排水良好的砂質壤土，壤土或粘壤土栽培。

四川芥菜生長期較短，不需假植。第五本葉展開時（約爲播種後廿五天）定植。取苗時，先將床土弄鬆，但不可切斷細根，使能附着床土，提高活著率。取苗動作要小心，不可損傷幼苗，影響莖瘤的形成，減少收量。

本圃畦寬九十公分，畦溝寬三十公分。每畦栽兩行，株間四十公分，每畝地約種四百一十株。本圃犁耕後整地，施基肥，化學肥料須充分混入土中，施栽植穴時應覆土避免接觸苗根。

許多農友栽培芥菜（刈菜）類，都以水肥爲主，四川芥菜施用適宜的化學肥料，更能促進生長，增加收量。



四、本圃的一般管理

(1) 病蟲害防治 病蟲害應注重預防。在排水不良地，高溫多濕時期，容易發生黑斑病、腐敗病、菌核病等。定植後每隔一星期，撒佈「大生」五百倍水溶液二至三次。撒佈「大生」時，可以混合殺蟲藥劑，同時預防害蟲的發生。下部葉有淡黃小病斑時，應迅速防治。

菜心螟、青蟲、蚜蟲爲主要害蟲。把握適期用PM乳劑、馬拉松、安特靈、DDT乳劑等殺除。但收穫前三十日內不可使用PM乳劑、馬拉松等藥劑。

(2) 中耕除草培土 四川芥菜根群淺，中耕培土能够促進根部生長。中耕不可過深，培土要培至莖帶綠處。

(3) 施肥 四川芥菜生育期間較短，生育迅速，須供給充分的水份及肥料，使形成嫩質莖瘤。追肥分爲定植後十日、廿五日二次施用。水肥應施於株間，靠近根部反而不利生長。生長最盛期株高約七十公分。施肥標準請看第二十六頁的表。

(下接第二十六頁)