

臺灣省農會配售優良菜種啓事

如有種子不良
貨款十倍賠償

本農會直接向日本タキイ種苗株式會社，選購優良蔬菜種子一批，現已運到，廉價配售。本會對該項種子，絕對負責。如因品種不純、不結球或發芽不良等，致農友遭受損失時，本農會照種子貨款十倍賠償。請當地農友，向當地農會訂購，或以郵購辦法，向本農會直接訂購亦可。

種子名稱	單位	價格	單位	價格
海谷三池中生甘藍	一〇〇公分	一三〇〇元	兩	四九〇元
黃葉サクセツシヨシ甘藍	一〇〇公分	一二〇〇元	兩	四五〇元

臺灣省農會

臺北市中正路一八四六號
郵政劃撥儲金七五五二號
電話：二八八一六—二八八一九

種子名稱	單位	價格	單位	價格
金澤白燕甘藍	一〇〇公分	一三〇〇元	兩	四九〇元
全金澤白燕甘藍	一〇〇公分	一三〇〇元	兩	四九〇元
丸葉山東白菜	一〇〇公分	五六〇元	兩	二一〇元
大葉半結球山東白菜	一〇〇公分	六〇〇元	兩	二三〇元
黃葉大阪中生白菜	一〇〇公分	四四〇元	兩	一七〇元

農業信箱

農業信箱信件，請在信封上寫「農問」二字，及詳細地址，以便迅速處理。

防除絲瓜毒葉病 避免連作及驅蟲

【問】：我栽有數棚絲瓜（菜瓜），水分、肥量、日光，一切均為良好，但結幼瓜時，花蕾噴開不出，甚至凸出異粒，終致枯黃。不知是何緣故，有否防治法？（高雄縣岡山鎮黃厝）

【答】：這是毒葉病，防治法為避免連作，及徹底驅除蟲害，無藥劑可治。（陳文郁）

豆類不宜連作

應與水稻隔種

【問】：本期種大豆的田裡，翌年第一期作可種落花生嗎？若可以，則對生長發育和收成量有否影響？又明年二期作可連續種大豆嗎？（臺中縣大甲鎮會善）

【答】：豆類的連作，實際上不適宜。若是大量大豆未有發生病害，可以栽培花生。

種花生只怕傳染病害，若無病害則對收成並無多大影響。又明年第二期作可以種大豆。現在農友中亦有連種大豆三次者，若無病害尚屬可以，但危險性較高，應該大豆收後栽植一期水稻，較為妥當。（余慶東）

栽培大豆須注意 品種時期及土壤

【問】：本人對大豆栽培甚感興趣，今有下面幾點問題請教：①驟降至立冬之間栽培那種好？②能不能于稻谷未收割前播於田間？③每分地需要多少種子？④早砂畑土春季栽培那種好？（雲林縣斗六鎮徐松泉）

【答】：關於所詢大豆問題，略答如次：①和降至立冬之間，栽培十石品種為佳。②第二期水稻收穫後栽培可以，但請選砂質土壤，如為其他土壤栽培者，成績不會良好（品種限於十石）。③每分地的種子量：十石為

五公升，三國為二公升，百美豆為二公升。④早砂畑土春季宜栽培十石品種。但自一月十五日起至一月廿五日止播種者，三國和百美豆亦可栽培。（洪再傳）

防除甘藍黑斑病 避免砂土及連作

【問】：我家有種數千棵甘藍菜，因颱風影響，菜葉發生斑點病，病葉分散很利害，請問此病如何防治？（臺北縣板橋鎮黃文來）

【答】：據寄來甘藍病害標本檢查結果，係細菌性黑斑病所為害。其防除方法如下：①此種病害如栽培於砂質土者發生較多，粘質土為少，故應在栽植以前慎重選擇圃地。②不可連作③此病可由昆蟲傳染，故應注意防治蟲害。（洪章訓）

本地雜種甘藍 易罹縮葉病害

【問】：我所栽培的甘藍品種是本地雜種，現到六、七、八月的期間發生捲葉病。未知應如何防治。（臺北市吳添生）

【答】：甘藍本地雜種發生捲葉病害，想是縮葉病，其防治方法：①選擇抗病品種②輪作③苗床注意排水④發病預兆之苗床或本圃，撒佈4-14式波爾多液或〇・四〇度波美之石灰硫磺合劑。（楊景濤）

甘藷種植適宜期 南部在八九月間

【問】：甘藷何時栽種為宜？為何舊曆十月間種的諸葉都枯死了？又舊曆可用尿素葉面施肥否？（臺南縣東山鄉蘇樹林）

【答】：甘藷種植適宜時期（南部）八九月間。舊曆十月，天氣太旱，氣溫降低，所插母莖上諸葉，當然枯死，現尚無理想方法可資補救。舊曆利用尿素葉面施肥，目前尚未試驗，僅試驗用作基肥及在甘藷種植後施用追肥，結果尚屬良好。（楊景濤）

矮性綠莢菜豆 二期水田裡作

【問】：最近所推廣的花蝶豆利用二期水稻收穫後如何整地，播種？用甚麼播種最好？（臺南縣白河鎮楊惠德）

【答】：所問花蝶豆係指近年來推廣之矮性綠莢菜豆而言。此種菜豆有兩個品種，均以利用嫩莢為主。一作期間約六十一七十天。如供二期水田裏作栽培，可於水稻收穫後充分耕犁、碎土、耙平並施用基肥。為便於灌溉排水，應做成畦面寬約一・二公尺，畦溝寬約四十一五十分公分的畦畦，每畦栽植三行，點播，株距二十公分，每穴播二—三粒，後間拔留二株。其他栽培方法請參閱農年七卷十五期陳文郁先生之文。（李文周）