

臺灣省農會配售優良菜種啓事

如有種子不良
貨款十倍賠償

本農會直接向日本タキイ種苗株式會社，選購優良蔬菜種子一批，現已運到，廉價配售。本會對該項種子，絕對負責。如因品種不純、不結球或發芽不良等，致農友遭受損失時，本農會照種子貨款十倍賠償。請當地農友，向當地農會訂購，或以郵購辦法，向本農會直接訂購亦可。

種子名稱	單位	價格	單位	價格
海谷三池中生甘藍	一〇〇公分	一三〇〇元	兩	四、九〇元
黃葉サクセツシヨシ甘藍	一〇〇公分	一二〇〇元	兩	四、五〇元

臺灣省農會

臺北市中正路一八四六號
郵政劃撥儲金七五五二號
電話：二八八一六—二八八一九

種子名稱	單位	價格	單位	價格
金澤白燕甘藍	一〇〇公分	一三〇〇元	兩	四、五〇元
全金澤白燕甘藍	一〇〇公分	一三〇〇元	兩	四、九〇元
丸葉山東白菜	一〇〇公分	五、六〇元	兩	二、一〇元
大葉半結球山東白菜	一〇〇公分	六、〇〇元	兩	二、三〇元
黃葉大阪中生白菜	一〇〇公分	四、四〇元	兩	一、七〇元

農業信箱

農業信箱信件，請在信封上寫「農問」二字，及詳細地址，以便迅速處理。

防除絲瓜毒葉病 避免連作及驅蟲

【問】：我栽有數棚絲瓜（菜瓜），水分、肥量、日光，一切均為良好，但結幼瓜時，花蕾噴開不出，甚至凸出異粒，終致枯黃。不知是何緣故，有否防治法？（高雄縣岡山鎮黃厝）

【答】：這是毒葉病，防治法為避免連作，及徹底驅除蟲害，無藥劑可治。（陳文郁）

豆類不宜連作

應與水稻隔種

【問】：本期種大豆的田裡，翌年第一期作可種落花生嗎？若可以，則對生長發育和收成量有否影響？又明年二期作可連續種大豆嗎？（臺中縣大甲鎮會善）

【答】：豆類的連作，實際上不適宜。若是大量大豆未有發生病害，可以栽培花生。

種花生只怕傳染病害，若無病害則對收成並無多大影響。又明年第二期作可以種大豆。現在農友中亦有連種大豆三次者，若無病害尚屬可以，但危險性較高，應該大豆收後栽植一期水稻，較為妥當。（余慶東）

栽培大豆須注意 品種時期及土壤

【問】：本人對大豆栽培甚感興趣，今有下面幾點問題請教：①驟降至立冬之間栽培那種好？②能不能于稻谷未收割前播於田間？③每分地需要多少種子？④早砂畑土春季栽培那種好？（雲林縣斗六鎮許松泉）

【答】：關於所詢大豆問題，略答如次：①和降至立冬之間，栽培十石品種為佳。②第二期水稻收穫後栽培可以，但請選砂質土壤，如為其他土壤栽培者，成績不會良好（品種限於十石）。③每分地的種子量：十石為

五公升，三國為二公升，百美豆為二公升。④早砂畑土春季宜栽培十石品種。但自一月十五日起至一月廿五日止播種者，三國和百美豆亦可栽培。（洪再傳）

防除甘藍黑斑病 避免砂土及連作

【問】：我家有種數千棵甘藍菜，因颱風影響，菜葉發生斑點病，病葉分散很利害，請問此病如何防治？（臺北縣板橋鎮黃文來）

【答】：據寄來甘藍病害標本檢查結果，係細菌性黑斑病所為害。其防除方法如下：①此種病害如栽培於砂質土者發生較多，粘質土為少，故應在栽植以前慎重選擇圃地。②不可連作③此病可由昆蟲傳染，故應注意防治蟲害。（洪章訓）

本地雜種甘藍 易罹縮葉病害

【問】：我所栽培的甘藍品種是本地雜種，現到六、七、八月的期間發生捲葉病。未知如何防治。（臺北市吳添生）

【答】：甘藍本地雜種發生捲葉病害，想是縮葉病，其防治方法：①選擇抗病品種②輪作③苗床注意排水④發病預兆之苗床或本圃，撒佈4-4式波爾多液或〇・四〇度波美之石灰硫磺合劑。（楊景濤）

甘藷種植適宜期 南部在八九月間

【問】：甘藷何時栽種為宜？為何舊曆十月間種的諸葉都枯死了？又舊曆可用尿素葉面施肥否？（臺南縣東山鄉蘇樹林）

【答】：甘藷種植適宜時期（南部）八九月間。舊曆十月，天氣太旱，氣溫降低，所插母莖上諸葉，當然枯死，現尚無理想方法可資補救。舊曆利用尿素葉面施肥，目前尚未試驗，僅試驗用作基肥及在甘藷種植後施用追肥，結果尚屬良好。（楊景濤）

矮性綠莢菜豆 二期水田裡作

【問】：最近所推廣的花蝶豆利用二期水稻收穫後如何整地，播種？用甚麼播種最好？（臺南縣白河鎮楊惠德）

【答】：所問花蝶豆係指近年來推廣之矮性綠莢菜豆而言。此種菜豆有兩個品種，均以利用嫩莢為主。一作期間約六十一七十天。如供二期水田裏作栽培，可於水稻收穫後充分耕犁、碎土、耙平並施用基肥。為便於灌溉排水，應做成畦面寬約一、二公尺，畦溝寬約四十一五十分公分的畦畦，每畦栽植三行，點播，株距二十公分，每穴播二—三粒，後間拔留二株。其他栽培方法請參閱農年七卷十五期陳文郁先生之文。（李文周）

梅宜濕氣及曝土
加工外銷不樂觀

【問】：請貴社賜答下面幾點有關梅果的問題：
①東部土質種梅果適合否？
②梅果有無好夕品種之分？梅苗須經核接否？何時種植為宜？行間與株間隔離如何？每甲當植幾株？
③梅果銷售之前途如何，臺灣自給是否
有餘？倘若種植十甲地之梅果，可否自設加工廠？加工之技術是否容易研究？
④梅苗栽種幾年後，就可採收？每株之收量如何？（臺東縣海端鄉郭瀾）

【答】：①梅宜在平地栽培，內地種更應選二五〇尺以上的山地。土質以礫質壤土或礫質黏土最適宜。②梅有品種優劣之分。栽培時宜選果大肉厚，風味良好而豐產之品種。必須經過核接才能保存品種原有之特性。定植時期在十二月至一月間，距離 4×4 公尺，每甲植六二五株。③梅果主供加工用，目前加工品外銷呆滯，而省內消費量有限，前途未可樂觀。若種植面積達十甲，可自設小規模之工廠加工。梅之加工方法不外鹽漬與糖漬兩種。④梅樹五、六年生時開始結果，結果最盛期在二十五年生前後，豐產之年本地種一株產一二〇公斤。（蔡致讓）

陳俊周圍高大雜木。如果是健康的，如①柑園中土肥太肥，或施氮肥太多，樹勢旺盛而徒長，那麼應該減施氮肥，多施磷鉀肥料。②植柑的枝梢是直立性的，尤其當樹齡小時，主枝側枝皆向上生長，不易生成花芽。應在九月間在大枝的頂端，吊掛石灰或磚，使枝下彎但不致折斷，則此枝上的側枝在秋冬形或多量花芽，明年就會開花結果了。結成幼果後應把石灰塊除去。（蔡致讓）

【問】：非肥包可以混合石灰波爾多液或其他新殺菌劑使用嗎？會不會減少殺菌的效力？其使用量多少？（屏東縣佳冬鄉陳福生）
【答】：非肥包是一種潔淨劑，可以用來改良某種殺菌劑之物理性能。石灰波爾多液，在正常情形下，物理性能已很好，可不必混用非肥包。有幾種殺菌劑，加非肥包一千倍後，可以減少沉澱。（陶家駒）

【問】：我種植的第二期水稻（在來種）因要防治稻熱病而撒佈西藥生石灰，每分地約三公斤，撒佈三日後去看時，稻葉均變成淡黃色，似將枯乾，嗣後始聽說西藥生石灰對蒸氣種可用，而對在來種不可用，是否真確？（臺南縣仁德鄉張百）
【答】：在來種撒佈西藥生石灰時，可惹起藥害，所以在施用時應注意撒佈的時間，須待稻葉上之水點乾涸後方可，這樣才可減輕西藥生石灰的藥害。（洪章訓）

【問】：爲何用DDT和BHC防治牛蟲，不能絕根，要怎樣作才澈底有效？（桃園縣觀音鄉歐文堂）
【答】：DDT和BHC等藥劑，對蟲卵是無效的，只是對成蟲有效，如將所有的成蟲全部殺死，蟲卵仍會孵化成蟲，必須繼續用藥，牛蟲才會根絕。注意牛金蟻蟻窩內及雜草等，都有殘留的成蟲，足以引起重新大量繁殖起來。所以驅除牛蟲，隔幾天施用藥品一次，經幾次用藥後才能撲滅牛蟲。（黃立章）

【問】：養殖河蚌（臺語加蚌）時應該注意那些事情，例如：水質、土質、溫度、水士之深度等。要用什麼飼料才容易長大？（臺北市昭安街五十巷六號）
【答】：本省所產河蚌均係一般養魚池或蓄水池以及農村水溝所生產者，並非專工養成的，利用養魚池亦係自然繁殖，同時產量又不多。蚌的生活環境，水質爲淡水，土質以壤土（泥與砂之混合土質）或泥土爲佳，溫度以較高的地方成長較速，食物爲天然餌料（即水中浮游生物俗稱微塵子），此種天然餌料以肥分較多的水中爲多。（會梅檀）

【問】：我家養有二隻仔豬，自購買當日就給牠圍一豬舍，分爲高低二層。高層利用竹床使牠們能休息安睡，下層係供牠們大小便之處。但牠們總是在上層竹床上排糞便，下層安睡，以致糞便水流下層影響衛生。請問如何即能使牠們習慣地在正當之地排糞便。（彰化縣埔鹽鄉楊錦敬）
【答】：豬舍不宜有兩層的，豬隻在舍內自己會選擇睡的地方及糞便的地方。你用竹架成兩層，因上層下面通風，不暖和，豬隻是不願意睡的，

【問】：植柑根太了仍不開花結果，可以在八、九月間行斷根法促進結果嗎？怎樣斷根法？其對柑枯有沒有害處？（臺中縣石岡鄉曾多菊）
【答】：植柑是嬌弱的果樹，不適宜於像斷根法那樣的粗暴方法促使結果。萬一施行斷根法不成功，樹勢就很難再恢復旺盛了。你的植柑樹如果不健康，應先找出原因，設法改善或補救。例如：①有病蟲害寄生，應趕緊防治。②水不良，葉片變黃，應開溝澆水。③園間陽光太少，樹蔭太濃，應

【問】：非肥包可以混合石灰波爾多液或其他新殺菌劑使用嗎？會不會減少殺菌的效力？其使用量多少？（屏東縣佳冬鄉陳福生）
【答】：非肥包是一種潔淨劑，可以用來改良某種殺菌劑之物理性能。石灰波爾多液，在正常情形下，物理性能已很好，可不必混用非肥包。有幾種殺菌劑，加非肥包一千倍後，可以減少沉澱。（陶家駒）

【問】：我種植的第二期水稻（在來種）因要防治稻熱病而撒佈西藥生石灰，每分地約三公斤，撒佈三日後去看時，稻葉均變成淡黃色，似將枯乾，嗣後始聽說西藥生石灰對蒸氣種可用，而對在來種不可用，是否真確？（臺南縣仁德鄉張百）
【答】：在來種撒佈西藥生石灰時，可惹起藥害，所以在施用時應注意撒佈的時間，須待稻葉上之水點乾涸後方可，這樣才可減輕西藥生石灰的藥害。（洪章訓）

【問】：爲何用DDT和BHC防治牛蟲，不能絕根，要怎樣作才澈底有效？（桃園縣觀音鄉歐文堂）
【答】：DDT和BHC等藥劑，對蟲卵是無效的，只是對成蟲有效，如將所有的成蟲全部殺死，蟲卵仍會孵化成蟲，必須繼續用藥，牛蟲才會根絕。注意牛金蟻蟻窩內及雜草等，都有殘留的成蟲，足以引起重新大量繁殖起來。所以驅除牛蟲，隔幾天施用藥品一次，經幾次用藥後才能撲滅牛蟲。（黃立章）

【問】：養殖河蚌（臺語加蚌）時應該注意那些事情，例如：水質、土質、溫度、水士之深度等。要用什麼飼料才容易長大？（臺北市昭安街五十巷六號）
【答】：本省所產河蚌均係一般養魚池或蓄水池以及農村水溝所生產者，並非專工養成的，利用養魚池亦係自然繁殖，同時產量又不多。蚌的生活環境，水質爲淡水，土質以壤土（泥與砂之混合土質）或泥土爲佳，溫度以較高的地方成長較速，食物爲天然餌料（即水中浮游生物俗稱微塵子），此種天然餌料以肥分較多的水中爲多。（會梅檀）

【問】：我家養有二隻仔豬，自購買當日就給牠圍一豬舍，分爲高低二層。高層利用竹床使牠們能休息安睡，下層係供牠們大小便之處。但牠們總是在上層竹床上排糞便，下層安睡，以致糞便水流下層影響衛生。請問如何即能使牠們習慣地在正當之地排糞便。（彰化縣埔鹽鄉楊錦敬）
【答】：豬舍不宜有兩層的，豬隻在舍內自己會選擇睡的地方及糞便的地方。你用竹架成兩層，因上層下面通風，不暖和，豬隻是不願意睡的，

【問】：植柑根太了仍不開花結果，可以在八、九月間行斷根法促進結果嗎？怎樣斷根法？其對柑枯有沒有害處？（臺中縣石岡鄉曾多菊）
【答】：植柑是嬌弱的果樹，不適宜於像斷根法那樣的粗暴方法促使結果。萬一施行斷根法不成功，樹勢就很難再恢復旺盛了。你的植柑樹如果不健康，應先找出原因，設法改善或補救。例如：①有病蟲害寄生，應趕緊防治。②水不良，葉片變黃，應開溝澆水。③園間陽光太少，樹蔭太濃，應

【問】：非肥包可以混合石灰波爾多液或其他新殺菌劑使用嗎？會不會減少殺菌的效力？其使用量多少？（屏東縣佳冬鄉陳福生）
【答】：非肥包是一種潔淨劑，可以用來改良某種殺菌劑之物理性能。石灰波爾多液，在正常情形下，物理性能已很好，可不必混用非肥包。有幾種殺菌劑，加非肥包一千倍後，可以減少沉澱。（陶家駒）

【問】：我種植的第二期水稻（在來種）因要防治稻熱病而撒佈西藥生石灰，每分地約三公斤，撒佈三日後去看時，稻葉均變成淡黃色，似將枯乾，嗣後始聽說西藥生石灰對蒸氣種可用，而對在來種不可用，是否真確？（臺南縣仁德鄉張百）
【答】：在來種撒佈西藥生石灰時，可惹起藥害，所以在施用時應注意撒佈的時間，須待稻葉上之水點乾涸後方可，這樣才可減輕西藥生石灰的藥害。（洪章訓）

【問】：爲何用DDT和BHC防治牛蟲，不能絕根，要怎樣作才澈底有效？（桃園縣觀音鄉歐文堂）
【答】：DDT和BHC等藥劑，對蟲卵是無效的，只是對成蟲有效，如將所有的成蟲全部殺死，蟲卵仍會孵化成蟲，必須繼續用藥，牛蟲才會根絕。注意牛金蟻蟻窩內及雜草等，都有殘留的成蟲，足以引起重新大量繁殖起來。所以驅除牛蟲，隔幾天施用藥品一次，經幾次用藥後才能撲滅牛蟲。（黃立章）

【問】：母兔生子幾巢就不再生？是不是交配數多生子的隻數便多？（金門縣承宗）
【答】：家兔生產，是在生後八個月至一年半爲最盛期，以後漸次能力低下，普通經過三年以上，不宜繁殖。母兔生產仔兔的多寡與交配次數多少無關係，完全要看母兔卵巢內一次排卵數與公兔之精蟲會合授精之數而定。（黃立章）

【問】：母兔生子幾巢就不再生？是不是交配數多生子的隻數便多？（金門縣承宗）
【答】：家兔生產，是在生後八個月至一年半爲最盛期，以後漸次能力低下，普通經過三年以上，不宜繁殖。母兔生產仔兔的多寡與交配次數多少無關係，完全要看母兔卵巢內一次排卵數與公兔之精蟲會合授精之數而定。（黃立章）

【問】：我家養有二隻仔豬，自購買當日就給牠圍一豬舍，分爲高低二層。高層利用竹床使牠們能休息安睡，下層係供牠們大小便之處。但牠們總是在上層竹床上排糞便，下層安睡，以致糞便水流下層影響衛生。請問如何即能使牠們習慣地在正當之地排糞便。（彰化縣埔鹽鄉楊錦敬）
【答】：豬舍不宜有兩層的，豬隻在舍內自己會選擇睡的地方及糞便的地方。你用竹架成兩層，因上層下面通風，不暖和，豬隻是不願意睡的，

【問】：植柑根太了仍不開花結果，可以在八、九月間行斷根法促進結果嗎？怎樣斷根法？其對柑枯有沒有害處？（臺中縣石岡鄉曾多菊）
【答】：植柑是嬌弱的果樹，不適宜於像斷根法那樣的粗暴方法促使結果。萬一施行斷根法不成功，樹勢就很難再恢復旺盛了。你的植柑樹如果不健康，應先找出原因，設法改善或補救。例如：①有病蟲害寄生，應趕緊防治。②水不良，葉片變黃，應開溝澆水。③園間陽光太少，樹蔭太濃，應

【問】：非肥包可以混合石灰波爾多液或其他新殺菌劑使用嗎？會不會減少殺菌的效力？其使用量多少？（屏東縣佳冬鄉陳福生）
【答】：非肥包是一種潔淨劑，可以用來改良某種殺菌劑之物理性能。石灰波爾多液，在正常情形下，物理性能已很好，可不必混用非肥包。有幾種殺菌劑，加非肥包一千倍後，可以減少沉澱。（陶家駒）

【問】：我種植的第二期水稻（在來種）因要防治稻熱病而撒佈西藥生石灰，每分地約三公斤，撒佈三日後去看時，稻葉均變成淡黃色，似將枯乾，嗣後始聽說西藥生石灰對蒸氣種可用，而對在來種不可用，是否真確？（臺南縣仁德鄉張百）
【答】：在來種撒佈西藥生石灰時，可惹起藥害，所以在施用時應注意撒佈的時間，須待稻葉上之水點乾涸後方可，這樣才可減輕西藥生石灰的藥害。（洪章訓）

【問】：爲何用DDT和BHC防治牛蟲，不能絕根，要怎樣作才澈底有效？（桃園縣觀音鄉歐文堂）
【答】：DDT和BHC等藥劑，對蟲卵是無效的，只是對成蟲有效，如將所有的成蟲全部殺死，蟲卵仍會孵化成蟲，必須繼續用藥，牛蟲才會根絕。注意牛金蟻蟻窩內及雜草等，都有殘留的成蟲，足以引起重新大量繁殖起來。所以驅除牛蟲，隔幾天施用藥品一次，經幾次用藥後才能撲滅牛蟲。（黃立章）

【問】：養殖河蚌（臺語加蚌）時應該注意那些事情，例如：水質、土質、溫度、水士之深度等。要用什麼飼料才容易長大？（臺北市昭安街五十巷六號）
【答】：本省所產河蚌均係一般養魚池或蓄水池以及農村水溝所生產者，並非專工養成的，利用養魚池亦係自然繁殖，同時產量又不多。蚌的生活環境，水質爲淡水，土質以壤土（泥與砂之混合土質）或泥土爲佳，溫度以較高的地方成長較速，食物爲天然餌料（即水中浮游生物俗稱微塵子），此種天然餌料以肥分較多的水中爲多。（會梅檀）

【問】：我家養有二隻仔豬，自購買當日就給牠圍一豬舍，分爲高低二層。高層利用竹床使牠們能休息安睡，下層係供牠們大小便之處。但牠們總是在上層竹床上排糞便，下層安睡，以致糞便水流下層影響衛生。請問如何即能使牠們習慣地在正當之地排糞便。（彰化縣埔鹽鄉楊錦敬）
【答】：豬舍不宜有兩層的，豬隻在舍內自己會選擇睡的地方及糞便的地方。你用竹架成兩層，因上層下面通風，不暖和，豬隻是不願意睡的，

【問】：母兔生子幾巢就不再生？是不是交配數多生子的隻數便多？（金門縣承宗）
【答】：家兔生產，是在生後八個月至一年半爲最盛期，以後漸次能力低下，普通經過三年以上，不宜繁殖。母兔生產仔兔的多寡與交配次數多少無關係，完全要看母兔卵巢內一次排卵數與公兔之精蟲會合授精之數而定。（黃立章）

【問】：母兔生子幾巢就不再生？是不是交配數多生子的隻數便多？（金門縣承宗）
【答】：家兔生產，是在生後八個月至一年半爲最盛期，以後漸次能力低下，普通經過三年以上，不宜繁殖。母兔生產仔兔的多寡與交配次數多少無關係，完全要看母兔卵巢內一次排卵數與公兔之精蟲會合授精之數而定。（黃立章）

【問】：我家養有二隻仔豬，自購買當日就給牠圍一豬舍，分爲高低二層。高層利用竹床使牠們能休息安睡，下層係供牠們大小便之處。但牠們總是在上層竹床上排糞便，下層安睡，以致糞便水流下層影響衛生。請問如何即能使牠們習慣地在正當之地排糞便。（彰化縣埔鹽鄉楊錦敬）
【答】：豬舍不宜有兩層的，豬隻在舍內自己會選擇睡的地方及糞便的地方。你用竹架成兩層，因上層下面通風，不暖和，豬隻是不願意睡的，

【問】：植柑根太了仍不開花結果，可以在八、九月間行斷根法促進結果嗎？怎樣斷根法？其對柑枯有沒有害處？（臺中縣石岡鄉曾多菊）
【答】：植柑是嬌弱的果樹，不適宜於像斷根法那樣的粗暴方法促使結果。萬一施行斷根法不成功，樹勢就很難再恢復旺盛了。你的植柑樹如果不健康，應先找出原因，設法改善或補救。例如：①有病蟲害寄生，應趕緊防治。②水不良，葉片變黃，應開溝澆水。③園間陽光太少，樹蔭太濃，應

【問】：非肥包可以混合石灰波爾多液或其他新殺菌劑使用嗎？會不會減少殺菌的效力？其使用量多少？（屏東縣佳冬鄉陳福生）
【答】：非肥包是一種潔淨劑，可以用來改良某種殺菌劑之物理性能。石灰波爾多液，在正常情形下，物理性能已很好，可不必混用非肥包。有幾種殺菌劑，加非肥包一千倍後，可以減少沉澱。（陶家駒）

【問】：我種植的第二期水稻（在來種）因要防治稻熱病而撒佈西藥生石灰，每分地約三公斤，撒佈三日後去看時，稻葉均變成淡黃色，似將枯乾，嗣後始聽說西藥生石灰對蒸氣種可用，而對在來種不可用，是否真確？（臺南縣仁德鄉張百）
【答】：在來種撒佈西藥生石灰時，可惹起藥害，所以在施用時應注意撒佈的時間，須待稻葉上之水點乾涸後方可，這樣才可減輕西藥生石灰的藥害。（洪章訓）

【問】：爲何用DDT和BHC防治牛蟲，不能絕根，要怎樣作才澈底有效？（桃園縣觀音鄉歐文堂）
【答】：DDT和BHC等藥劑，對蟲卵是無效的，只是對成蟲有效，如將所有的成蟲全部殺死，蟲卵仍會孵化成蟲，必須繼續用藥，牛蟲才會根絕。注意牛金蟻蟻窩內及雜草等，都有殘留的成蟲，足以引起重新大量繁殖起來。所以驅除牛蟲，隔幾天施用藥品一次，經幾次用藥後才能撲滅牛蟲。（黃立章）

【問】：養殖河蚌（臺語加蚌）時應該注意那些事情，例如：水質、土質、溫度、水士之深度等。要用什麼飼料才容易長大？（臺北市昭安街五十巷六號）
【答】：本省所產河蚌均係一般養魚池或蓄水池以及農村水溝所生產者，並非專工養成的，利用養魚池亦係自然繁殖，同時產量又不多。蚌的生活環境，水質爲淡水，土質以壤土（泥與砂之混合土質）或泥土爲佳，溫度以較高的地方成長較速，食物爲天然餌料（即水中浮游生物俗稱微塵子），此種天然餌料以肥分較多的水中爲多。（會梅檀）

【問】：我家養有二隻仔豬，自購買當日就給牠圍一豬舍，分爲高低二層。高層利用竹床使牠們能休息安睡，下層係供牠們大小便之處。但牠們總是在上層竹床上排糞便，下層安睡，以致糞便水流下層影響衛生。請問如何即能使牠們習慣地在正當之地排糞便。（彰化縣埔鹽鄉楊錦敬）
【答】：豬舍不宜有兩層的，豬隻在舍內自己會選擇睡的地方及糞便的地方。你用竹架成兩層，因上層下面通風，不暖和，豬隻是不願意睡的，

優待豐年讀者 本日美國優良種子廉供

品名	一壺兩價格
△長岡交配一號甘藍	七〇元
△純黃葉三池中生甘藍	四元
△三年子成功中生甘藍	六元
△長岡交配新一號白菜	三元
△長岡交配二號白菜	三元
△長岡交配理想白菜	三元
△長岡交配四元白菜	三元
△交配完全結球白菜	四元
△京都三號結球白菜	四元
△包頭連結球白菜	四元
△金門早生大型結頭菜	一元
△金澤粗欄結頭菜	一元
△美國紫玉結頭菜	一元
△美國中生包心白菜	三元
△彰浦晚生包心白菜	三元
△彰浦晚生包心白菜	三元
△美國加州大甜椒	二元
△正美國晚生花椰菜	二元
△美國紅心五寸人參	一磅價格
△美國豐肉六寸人參	九〇元
△美國長形五寸人參	九〇元
△美國時無五寸人參	九〇元
△瀧野川大長牛蒡	七〇元
△大花心白菜	三〇元

新貨到美①麗裝各花種花球每大粒五元 中三元 小二元

總代理 臺灣農資材公司 臺北市化迪街一段六號 郵政劃撥二七九號

豬眼紅腫有屎 用硼酸水洗淨

【問】：我有二只小豬，食慾不常，眼睛發紅，每日流眼屎，請獸醫注射過「ベニシリン」但是沒有奏效，請問是何原因？應如何治療？（雲林縣林內鄉鄭寬定）

【答】：豬之眼睛發紅且有眼屎，可能是眼結膜炎，單注射盤尼西林是沒有什麼用的，要用3%硼酸水洗眼，然後用地盤素眼藥膏塗入其內，如此做，約一星期即可好。（黃立羣）

應用明礬清水 禽畜飲用注意

【問】：啟場所用食水，皆賴明礬加入水中沉清。不知場中所蓄鷄鳥食用該水有否得害。（屏東縣振興農牧場）

【答】：以明礬澄清之水飼養禽畜是沒有關係的。但其沉澱物切不可為禽畜食用，此沉澱物可致禽畜發生腹瀉。（李登元）

母鷄卵巢潰瘍 可能由於白痢

【問】：生蛋母鷄常發生卵巢潰瘍或腹內積水症而不治，請問是何原因？預防法怎樣？（高雄市楠梓區陳甲庚）

【答】：生蛋母鷄常發生卵巢潰瘍或腹內積水，多因慢性疾病而引起，這種病即或不死，其生產率也會極低，甚至不產卵，故應加淘汰。尤其是卵巢潰瘍情形，亦可能由於母鷄患白痢病所致，所以你的鷄羣每年至少要請獸醫檢查一次，做鷄白痢病測驗，有陽性反應或懷疑者，即予淘汰，以預防傳染。（李登元）

分類廣告

△本欄廣告每廿五行，每行六號字九個，每行收費六元。
△廣告費請利用郵政劃撥寄下。
△電話接洽請撥四七一三一。
△來稿請在出版前兩星期前寄到。

徵求

農業新聞

各地營業處主任兼記者簡章附郵資二元即寄臺中市中區富貴巷48號 農業新聞社啟

讓售

純種陸地鴨

世界著名鴨蛋年產三百以上純種卵及幼雛出售函洽南縣將軍鄉西和村九號林炎山

廉贈

純蘇魯木瓜
瓜苗：每株四角帶土六角包一元（草約備索）均另加運金
瓜種：保證發芽率八成以上，郵票三元
寄彰化縣二水鄉本園贈成百粒。零售每粒五分。千粒四分。萬粒三分三萬粒兩分
一木瓜特刊一全省獨一無二瓜專特均保專家名著四十餘篇六萬餘言種圖四十餘。特價四元，每冊附贈種子六十粒，購種百元以上送一冊想種木瓜必須先讀已種木瓜不可不讀。
◎款寄郵政儲金一三五七六號（免運費）
樹德苗圃 敬啟

種菌

機械化科學化大量製最純粹最強力最新鮮
臺中縣霧峰鄉坑口村養蜂養菌場 陳發砂
本省水果中售價最高的果實發售零售價廿元
歡迎參觀，三年生甲當年收州萬元以上種植後壹年得開花結實
日本茂木枇杷
種田中枇杷
每株 二五元
請付郵票函詢詳應答
臺中縣太平鄉東平村山仔脚37號
綜合果樹試驗園 李煥城

紫雲英

公斤四拾元（含郵費）
新市南市里中華路三六四之三江桂治

速效氮肥

牌登豐
純蘇魯木瓜
瓜苗：每株四角帶土六角包一元（草約備索）均另加運金
瓜種：保證發芽率八成以上，郵票三元
寄彰化縣二水鄉本園贈成百粒。零售每粒五分。千粒四分。萬粒三分三萬粒兩分
一木瓜特刊一全省獨一無二瓜專特均保專家名著四十餘篇六萬餘言種圖四十餘。特價四元，每冊附贈種子六十粒，購種百元以上送一冊想種木瓜必須先讀已種木瓜不可不讀。
◎款寄郵政儲金一三五七六號（免運費）
樹德苗圃 敬啟

芳茂種苗園

由日輸入第二代
葡萄苗種 出售
A、甲州。粒粗大種
長圓形十釐兩以上淡紫紅色味甘肉軟晚生
豐收特利品種。
B Campbell Early
（日名キヤムベルア
ーリ）粒圓大種圓

其他產品：

◎硝酸銨 96.8%
◎硝酸 60%
◎無水氨 98.5%
◎氧氣 98.5%
請向本公司營業課洽
購地址花蓮市民意里
25號 電話三八六號

番茄可以飼豬 份量不宜太多

【問】：我養有十隻小豬，很喜歡食番茄果（經過煮熟），請問：番茄養豬對豬隻生長是否有益，其對大豬及小豬的營養何者為好？（臺南縣仁德鄉張適）

【答】：番茄可為豬隻的青飼料，對於豬隻生長是很有益處的，所以不宜煮熟。小豬生長需要豐富蛋白質的飼料，用於大肥豬是不宜超過全日糧量三分之一，用於大肥豬是可以多用的，但不宜超過日糧量的一半。（李登元）

形約七八釐兩紫黑色
味極甘有特殊芬芳產
量極多早生奇種。
豐原鎮西豐里中山路
一二二號東華果實園

◎各種優良種苗出售
高瑞補柑苗五萬株，
大葉柑柑苗一萬株，
純晚生晚奇西亞苗一
萬株。美國甜橙二
百株。酸金柑苗二千
株。短脚柑柑苗五百
株。紅肉李苗五百株，
觀賞用正梅花，杏
花各一千株。美國種
紫色葡萄苗一千株各
種高度三英尺左右系
統可靠做園自營各種
母樹數千株。歡迎各
界人士撥駕參觀賜顧
鎮中新里中寮桃園縣
政府委託繁殖苗圃
明茂農園 陳臣烟

Dr. SALSBUARY'S 贈樣品 美國沙氏大藥廠出品 養鷄用品 藥名 藥粉 3號街 190號 蘇法

REN-O-SAL 利爾素 SULQUIN SOLUBLE POWDER 蘇爾奎藥粉
POLYSTAT 保力使大SULFA. VETERINARY 蘇法

蘇法 功效：能治雞白痢及雞火雞小腸蟲病。保贈一冊。
保力使大 功效：防治雞白痢及雞火雞小腸蟲病。多贈一冊。
附郵票一元並指定藥廠函索沙氏英文原裝版

分類廣告
收效宏大
刊價便宜
歡迎刊登