

梅宜濕氣及曝土
加工外銷不樂觀

【問】：請貴社賜答下面幾點有關梅果的問題：
①東部土質種梅果適合否？
②梅果有無好夕品種之分？梅苗須經核接否？何時種植為宜？行間與株間隔離如何？每甲當植幾株？
③梅果銷售之前途如何，臺灣自給是否
有餘？倘若種植十甲地之梅果，可否自設加工廠？加工之技術是否容易研究？
④梅苗栽種經幾年後，就可採收？每株之收量如何？（臺東縣海端鄉郭瀾）

【答】：①梅宜在平地栽培，內地種更應選二五〇尺以上的山地。土質以礫質壤土或礫質黏土最適宜。②梅有品種優劣之分。栽培時宜選果大肉厚，風味良好而豐產之品種。必須經過核接才能保存品種原有之特性。定植時期在十二月至一月間，距離 4×4 公尺，每甲植六二五株。③梅果主供加工用，目前加工品外銷呆滯，而省內消費量有限，前途未可樂觀。若種植面積達十甲，可自設小規模之工廠加工。梅之加工方法不外鹽漬與糖漬兩種。④梅樹五、六年生時開始結果，結果最盛期在二十五年生前後，豐產之年本地種一株產一二〇公斤。（蔡致讓）

陳俊周圍高大雜木。如果是健康的，如①柑園中土肥太肥，或施氮肥太多，樹勢旺盛而徒長，那麼應該減施氮肥，多施磷鉀肥料。②植柑的枝梢是直立性的，尤其當樹齡小時，主枝側枝皆向上生長，不易生成花芽。應在九月間在大枝的頂端，吊掛石灰或磚，使枝下彎但不致折斷，則此枝上的側枝在秋冬形或多量花芽，明年就會開花結果了。結成幼果後應把石灰塊除去。（蔡致讓）

【問】：非肥包可以混合石灰波爾多液或其他新殺菌劑使用嗎？會不會減少殺菌的效力？其使用量多少？（屏東縣佳冬鄉陳福生）
【答】：非肥包是一種潔淨劑，可以用來改良某種殺菌劑之物理性能。石灰波爾多液，在正常情形下，物理性能已很好，可不必混用非肥包。有幾種殺菌劑，加非肥包一千倍後，可以減少沉澱。（陶家駒）

【問】：我種植的第二期水稻（在來種）因要防治稻熱病而撒佈西藥生石灰，每分地約三公斤，撒佈三日後去看時，稻葉均變成淡黃色，似將枯乾，嗣後始聽說西藥生石灰對蒸氣種可用，而對在來種不可用，是否真確？（臺南縣仁德鄉張百）
【答】：在來種撒佈西藥生石灰時，可惹起藥害，所以在施用時應注意撒佈的時間，須待稻葉上之水點乾涸後方可，這樣才可減輕西藥生石灰的藥害。（洪章訓）

【問】：爲何用DDT和BHC防治牛蟲，不能絕根，要怎樣作才澈底有效？（桃園縣觀音鄉歐文堂）
【答】：DDT和BHC等藥劑，對蟲卵是無效的，只是對成蟲有效，如將所有的成蟲全部殺死，蟲卵仍會孵化成蟲，必須繼續用藥，牛蟲才會根絕。注意牛金蟻蟻窩內及雜草等，都有殘留的成蟲，足以引起重新大量繁殖起來。所以驅除牛蟲，隔幾天施用藥品一次，經幾次用藥後才能撲滅牛蟲。（黃立章）

【問】：養殖河蚌（臺語加蚌）時應該注意那些事情，例如：水質、土質、溫度、水士之深度等。要用什麼飼料才容易長大？（臺北市昭安街五十巷六號）
【答】：本省所產河蚌均係一般養魚池或蓄水池以及農村水溝所生產者，並非專工養成的，利用養魚池亦係自然繁殖，同時產量又不多。蚌的生活環境，水質爲淡水，土質以壤土（泥與砂之混合土質）或泥土爲佳，溫度以較高的地方成長較速，食物爲天然餌料（即水中浮游生物俗稱微塵子），此種天然餌料以肥份較多的水中爲多。（會梅檀）

【問】：我家養有二隻仔豬，自購買當日就給牠圍一豬舍，分爲高低二層。高層利用竹床使牠們能休息安睡，下層係供牠們大小便之處。但牠們總是在上層竹床上排糞便，下層安睡，以致糞便水流下層影響衛生。請問如何即能使牠們習慣地在正當之地排糞便。（彰化縣埔鹽鄉楊錦敬）
【答】：豬舍不宜有兩層的，豬隻在舍內自己會選擇睡的地方及糞便的地方。你用竹架成兩層，因上層下面通風，不暖和，豬隻是不願意睡的，

【問】：植柑樹大了仍不開花結果，可以在八、九月間行斷根法促進結果嗎？怎樣斷根法？其對柑樹有沒有害處？（臺中縣石岡鄉曾多菊）
【答】：植柑是嬌弱的果樹，不適宜於像斷根法那樣的粗暴方法促使結果。萬一施行斷根法不成功，樹勢就很難再恢復旺盛了。你的植柑樹如果不健康，應先找出原因，設法改善或補救。例如：①有病蟲害寄生，應趕緊防治。②水不良，葉片變黃，應開溝澆水。③園間陽光太少，樹蔭太濃，應

【問】：非肥包可以混合石灰波爾多液或其他新殺菌劑使用嗎？會不會減少殺菌的效力？其使用量多少？（屏東縣佳冬鄉陳福生）
【答】：非肥包是一種潔淨劑，可以用來改良某種殺菌劑之物理性能。石灰波爾多液，在正常情形下，物理性能已很好，可不必混用非肥包。有幾種殺菌劑，加非肥包一千倍後，可以減少沉澱。（陶家駒）

【問】：我種植的第二期水稻（在來種）因要防治稻熱病而撒佈西藥生石灰，每分地約三公斤，撒佈三日後去看時，稻葉均變成淡黃色，似將枯乾，嗣後始聽說西藥生石灰對蒸氣種可用，而對在來種不可用，是否真確？（臺南縣仁德鄉張百）
【答】：在來種撒佈西藥生石灰時，可惹起藥害，所以在施用時應注意撒佈的時間，須待稻葉上之水點乾涸後方可，這樣才可減輕西藥生石灰的藥害。（洪章訓）

【問】：爲何用DDT和BHC防治牛蟲，不能絕根，要怎樣作才澈底有效？（桃園縣觀音鄉歐文堂）
【答】：DDT和BHC等藥劑，對蟲卵是無效的，只是對成蟲有效，如將所有的成蟲全部殺死，蟲卵仍會孵化成蟲，必須繼續用藥，牛蟲才會根絕。注意牛金蟻蟻窩內及雜草等，都有殘留的成蟲，足以引起重新大量繁殖起來。所以驅除牛蟲，隔幾天施用藥品一次，經幾次用藥後才能撲滅牛蟲。（黃立章）

【問】：養殖河蚌（臺語加蚌）時應該注意那些事情，例如：水質、土質、溫度、水士之深度等。要用什麼飼料才容易長大？（臺北市昭安街五十巷六號）
【答】：本省所產河蚌均係一般養魚池或蓄水池以及農村水溝所生產者，並非專工養成的，利用養魚池亦係自然繁殖，同時產量又不多。蚌的生活環境，水質爲淡水，土質以壤土（泥與砂之混合土質）或泥土爲佳，溫度以較高的地方成長較速，食物爲天然餌料（即水中浮游生物俗稱微塵子），此種天然餌料以肥份較多的水中爲多。（會梅檀）

【問】：我家養有二隻仔豬，自購買當日就給牠圍一豬舍，分爲高低二層。高層利用竹床使牠們能休息安睡，下層係供牠們大小便之處。但牠們總是在上層竹床上排糞便，下層安睡，以致糞便水流下層影響衛生。請問如何即能使牠們習慣地在正當之地排糞便。（彰化縣埔鹽鄉楊錦敬）
【答】：豬舍不宜有兩層的，豬隻在舍內自己會選擇睡的地方及糞便的地方。你用竹架成兩層，因上層下面通風，不暖和，豬隻是不願意睡的，

【問】：植柑樹大了仍不開花結果，可以在八、九月間行斷根法促進結果嗎？怎樣斷根法？其對柑樹有沒有害處？（臺中縣石岡鄉曾多菊）
【答】：植柑是嬌弱的果樹，不適宜於像斷根法那樣的粗暴方法促使結果。萬一施行斷根法不成功，樹勢就很難再恢復旺盛了。你的植柑樹如果不健康，應先找出原因，設法改善或補救。例如：①有病蟲害寄生，應趕緊防治。②水不良，葉片變黃，應開溝澆水。③園間陽光太少，樹蔭太濃，應

【問】：請貴社賜答下面幾點有關梅果的問題：
①東部土質種梅果適合否？
②梅果有無好夕品種之分？梅苗須經核接否？何時種植為宜？行間與株間隔離如何？每甲當植幾株？
③梅果銷售之前途如何，臺灣自給是否
有餘？倘若種植十甲地之梅果，可否自設加工廠？加工之技術是否容易研究？
④梅苗栽種經幾年後，就可採收？每株之收量如何？（臺東縣海端鄉郭瀾）

【問】：非肥包可以混合石灰波爾多液或其他新殺菌劑使用嗎？會不會減少殺菌的效力？其使用量多少？（屏東縣佳冬鄉陳福生）
【答】：非肥包是一種潔淨劑，可以用來改良某種殺菌劑之物理性能。石灰波爾多液，在正常情形下，物理性能已很好，可不必混用非肥包。有幾種殺菌劑，加非肥包一千倍後，可以減少沉澱。（陶家駒）

【問】：我種植的第二期水稻（在來種）因要防治稻熱病而撒佈西藥生石灰，每分地約三公斤，撒佈三日後去看時，稻葉均變成淡黃色，似將枯乾，嗣後始聽說西藥生石灰對蒸氣種可用，而對在來種不可用，是否真確？（臺南縣仁德鄉張百）
【答】：在來種撒佈西藥生石灰時，可惹起藥害，所以在施用時應注意撒佈的時間，須待稻葉上之水點乾涸後方可，這樣才可減輕西藥生石灰的藥害。（洪章訓）

【問】：母兔生子幾隻就不再生？是不是交配數多生子的隻數便多？（金門賴承宗）
【答】：家兔生產，是在生後八個月至一年半爲最盛期，以後漸次能力低下，普通經過三年以上，不宜繁殖。母兔生產仔兔的多寡與交配次數多少無關係，完全要看母兔卵巢內一次排卵數與公兔之精蟲會合授精之數而定。（黃立章）

【問】：母兔生子幾隻就不再生？是不是交配數多生子的隻數便多？（金門賴承宗）
【答】：家兔生產，是在生後八個月至一年半爲最盛期，以後漸次能力低下，普通經過三年以上，不宜繁殖。母兔生產仔兔的多寡與交配次數多少無關係，完全要看母兔卵巢內一次排卵數與公兔之精蟲會合授精之數而定。（黃立章）

【問】：我家養有二隻仔豬，自購買當日就給牠圍一豬舍，分爲高低二層。高層利用竹床使牠們能休息安睡，下層係供牠們大小便之處。但牠們總是在上層竹床上排糞便，下層安睡，以致糞便水流下層影響衛生。請問如何即能使牠們習慣地在正當之地排糞便。（彰化縣埔鹽鄉楊錦敬）
【答】：豬舍不宜有兩層的，豬隻在舍內自己會選擇睡的地方及糞便的地方。你用竹架成兩層，因上層下面通風，不暖和，豬隻是不願意睡的，

【問】：植柑樹大了仍不開花結果，可以在八、九月間行斷根法促進結果嗎？怎樣斷根法？其對柑樹有沒有害處？（臺中縣石岡鄉曾多菊）
【答】：植柑是嬌弱的果樹，不適宜於像斷根法那樣的粗暴方法促使結果。萬一施行斷根法不成功，樹勢就很難再恢復旺盛了。你的植柑樹如果不健康，應先找出原因，設法改善或補救。例如：①有病蟲害寄生，應趕緊防治。②水不良，葉片變黃，應開溝澆水。③園間陽光太少，樹蔭太濃，應

【問】：請貴社賜答下面幾點有關梅果的問題：
①東部土質種梅果適合否？
②梅果有無好夕品種之分？梅苗須經核接否？何時種植為宜？行間與株間隔離如何？每甲當植幾株？
③梅果銷售之前途如何，臺灣自給是否
有餘？倘若種植十甲地之梅果，可否自設加工廠？加工之技術是否容易研究？
④梅苗栽種經幾年後，就可採收？每株之收量如何？（臺東縣海端鄉郭瀾）

【問】：非肥包可以混合石灰波爾多液或其他新殺菌劑使用嗎？會不會減少殺菌的效力？其使用量多少？（屏東縣佳冬鄉陳福生）
【答】：非肥包是一種潔淨劑，可以用來改良某種殺菌劑之物理性能。石灰波爾多液，在正常情形下，物理性能已很好，可不必混用非肥包。有幾種殺菌劑，加非肥包一千倍後，可以減少沉澱。（陶家駒）

【問】：我種植的第二期水稻（在來種）因要防治稻熱病而撒佈西藥生石灰，每分地約三公斤，撒佈三日後去看時，稻葉均變成淡黃色，似將枯乾，嗣後始聽說西藥生石灰對蒸氣種可用，而對在來種不可用，是否真確？（臺南縣仁德鄉張百）
【答】：在來種撒佈西藥生石灰時，可惹起藥害，所以在施用時應注意撒佈的時間，須待稻葉上之水點乾涸後方可，這樣才可減輕西藥生石灰的藥害。（洪章訓）

【問】：爲何用DDT和BHC防治牛蟲，不能絕根，要怎樣作才澈底有效？（桃園縣觀音鄉歐文堂）
【答】：DDT和BHC等藥劑，對蟲卵是無效的，只是對成蟲有效，如將所有的成蟲全部殺死，蟲卵仍會孵化成蟲，必須繼續用藥，牛蟲才會根絕。注意牛金蟻蟻窩內及雜草等，都有殘留的成蟲，足以引起重新大量繁殖起來。所以驅除牛蟲，隔幾天施用藥品一次，經幾次用藥後才能撲滅牛蟲。（黃立章）

【問】：養殖河蚌（臺語加蚌）時應該注意那些事情，例如：水質、土質、溫度、水士之深度等。要用什麼飼料才容易長大？（臺北市昭安街五十巷六號）
【答】：本省所產河蚌均係一般養魚池或蓄水池以及農村水溝所生產者，並非專工養成的，利用養魚池亦係自然繁殖，同時產量又不多。蚌的生活環境，水質爲淡水，土質以壤土（泥與砂之混合土質）或泥土爲佳，溫度以較高的地方成長較速，食物爲天然餌料（即水中浮游生物俗稱微塵子），此種天然餌料以肥份較多的水中爲多。（會梅檀）

優待豐年讀者 本日美國優良種子廉供

| | |
|------------|-----|
| △長岡交配一號甘藍 | 四元 |
| △純黃葉三池中生甘藍 | 七〇元 |
| △三年子成功中生甘藍 | 四元 |
| △長岡交配新一號白菜 | 三元 |
| △長岡交配二號白菜 | 三元 |
| △長岡交配理想白菜 | 三元 |
| △長岡交配四元白菜 | 三元 |
| △交配完全結球白菜 | 四元 |
| △京都三號結球白菜 | 四元 |
| △包頭連結球白菜 | 四元 |
| △金門早生大型結球菜 | 一元 |
| △金澤粗欄結球菜 | 一元 |
| △美國紫玉結球菜 | 一元 |
| △美國紫玉結球菜 | 一元 |
| △彰浦中生包心白菜 | 三元 |
| △彰浦晚生包心白菜 | 三元 |
| △彰浦晚生包心白菜 | 三元 |
| △美國加州大甜椒 | 二元 |
| △正美國晚生花椰菜 | 二元 |
| △美國紅心五寸人參 | 九〇元 |
| △美國豐肉六寸人參 | 九〇元 |
| △美國長形五寸人參 | 九〇元 |
| △美國時無五寸人參 | 九〇元 |
| △瀧野川大長牛蒡 | 七〇元 |
| △大花心白菜 | 三〇元 |

●洋菇現貨供應特價
一瓶一八元 應附郵費三元
十瓶一五〇元

新到美國各名種花露水
每大瓶一元五角 每中瓶一元二角 每小瓶一元

總代理 臺灣農資材公司
臺北市化迪街一段六八號
郵政掛號二一七九號