



注意防治乳豬白痢症

江·清·海·

我家一頭母猪，在半月前生下一胎九隻的小豬，隻隻肥胖活潑，大家都說這是「土地公財」。但是到日前，全部小豬突然排出白色稀糞，同時從口中吐出與糞便一樣的白色漿狀物。請貴社趕緊告訴我，應該怎樣治療。

高雄縣橋頭鄉 王惠宗

我家飼養兩頭母猪，均已生產兩次。第一胎小豬，生下來第二天就發生白痢症，經注射「混美能」治療約三星期，才完全治好。最近，兩頭母猪同時生產，而且兩頭都是與第一次一樣生七頭小豬。在生產後第二天，又發現小豬白痢症了。請問貴社，有什麼辦法預防？

屏東縣里港鄉 楊明義

農友們，你的乳豬患過白痢病麼？是否因此遭到意外的損失？乳豬白痢病，在本省各地都很流行，相信飼養母猪的農友，都吃過這個病的苦頭。

一、發病原因很多

乳豬患白痢症的原因很多，在預防與治療時，都應先查明發病的原因。


(1) 母乳不良 母猪過肥，濃厚飼料過多，青飼料不足，鈣質或維生素缺少，都會使母猪乳汁中

的脂肪過多，乳汁過於濃厚。變質的飼料會使乳汁酸度過高。母猪患熱性病、感冒、產褥熱及乳房炎等疾病，都可能使母猪乳質變化。小豬吃到這種不良母乳後，就引起胃腸炎，發生白痢病。

(2) 乳豬受涼 猪舍床面及褥草潮濕，乳豬受涼，也可能引起白痢症。

(3) 寄生蟲作怪 乳豬腹內寄生一種寄生蟲——猪糞桿蟲，也容易引起白痢症。這種寄生蟲，寄生於生後三個月以內的幼猪小腸內。

(4) 細菌與毒素。 (5) 不容易消化的飼料 幼猪吃到不容易消化的飼料，例如米糠(含脂肪過多)、魚粉、魚骨、內臟、豆餅等都可發生下痢。



(健康的猪乳響影乳母，乳母響影料飼)

二、下痢、消瘦、死亡

猪白痢症的病徵如下：

(1) 乳猪排出白色的稀糞，起先是白色漿狀的，後來瀉得厲害，就變成帶黃色水樣的。

(2) 稀糞有一種特別的臭味。 (3) 患病後，不但發育停止，在一兩天內就消瘦，精神萎頓，猪毛失去光澤。 (4) 如病症繼續嚴重，病猪就不能站立，因心臟衰弱死亡。(經治療的仔猪，發育也較差)。

(5) 此病通常在小猪哺乳期間容易發生，早在分娩後二至三日就發生。在乳猪開始吃飼料時，也容易發生。

三、及早治療效果較好

發現乳猪排出白色稀糞時，要趕緊治療。白痢病在初期治療比較容易恢復，發病過久就難治療。

除去病因

治療方法首先要找出發病的病因，除去病因，然後對症下藥，才有好的結果。發病的原因如上述，例如：母猪飼料不適當，精料(濃厚飼料)過多，蛋白質飼料(尤其是動物性飼料如魚粉、魚內臟、脫脂乳粉等)過多，給與酸敗飼料，母猪患疾病等。如有上列種種原因，要立即改善，同時趕緊開始用藥治療。

內服藥治療

(1) 膈胺吡啶(スルファグアニチン) 〇.五公分，次硝酸蒼鉛一.〇公分，重曹三.〇公分。一天分三次給藥。

(2) 膈胺美拉淨(スルファメラチン，或ロメ

チンソーダ) ○・五公分，木炭末三公分，重曹三公分，一天分二次給與。

(3) 蘇爾美 (スルメット) ○・五公分，木炭末三公分，一天分二次給與。

這裡所開的是生後一個月後乳豬每頭每日用藥量，較大或較小的豬，可以酌予增減。

給藥的方法：①將藥品研細，混合均勻，放在小容器內，加少量水，攪拌成爲泥狀，用湯匙灌入小豬嘴內。②灌藥時助手將仔豬的兩前腳抓住，頭部向上，等牠的口張開時，將準備好的藥投入牠的舌根部，等牠吞下後才放牠下去。③開始吃飼料的小豬，可將藥物混合在飼料內給與。

注射治療

列藥品，效果很好。

病狀嚴重，服藥效果不大，或給藥困難時，可以注射下

青菜、青草等) 及鈣質 (蚶殼粉) 和維他命類 (魚肝油及其他維他命)。

飼料。

四、怎樣預防？

(1) 哺乳母豬不可給與過多的濃厚飼料或腐敗也。如同時內服與注射治療，效果最好。


本省製造的「混美能」、「治炎能」等，效果

(1) 膾炙美拉淨 (スルフアメラチン，日製ロメチン，臺製スルフコム等) 每日二・五立方公分，一次打完。

(2) 蘇爾美注射劑：每次○・五立方公分，每日一次至二次。

培元

式公計估重體豬



$$\text{體重} = (\text{胸圍} \times \text{胸圍} \times \text{體長}) \div 400$$

豬的體重，用稱秤稱最準確。但是當你手頭沒有稱，或是人手不足時，也可用下面的公式，來估計大概的體重。(長度單位用「吋」，體重單位用「磅」) 體長自尾巴基部起，沿着背脊，量至兩耳間的中點。這時，豬頭應向前向下。

這公式用在一百五十至四百磅的豬，比較正確。在一百五十磅以下，或四百磅以上時，必需用下表校正。註：一公分約等於○・三九三七吋，一公斤約等於二・二磅。

體重	校正數	體重	校正數
一五磅以下	七	三三〇—三三五磅	三〇
一五—二〇磅	不必校正	三三六—三四〇磅	四〇
二〇—二五磅	一〇	三四一—三四五磅	五〇
二五—三〇磅	二〇	三四六—三五〇磅	六〇
三〇—三五磅	三〇	三五一—三五五磅	七〇
三五—四〇磅	四〇	三五七磅以上	八〇



(門窗的舍豬好關意注要天冬)

- 使及早恢復健康，避免因乳質變化而使幼豬發生消化障礙。
- (4) 分娩後豬舍內要保持清潔乾燥，舍內應時常放乾淨的褥草。褥草如被豬糞尿污染，應即時更換。
- (5) 除豬舍要保持乾燥，供給清潔褥草外，冬天必需注意關好窗門。
- (6) 剛開始吃飼料的乳豬，要注意飼料配合和調理方法。不容易消化的飼料 (如米糠)，不新鮮的生魚骨頭或內臟，魚粉和脫脂奶粉等，都不可給與太多。
- (7) 最好的乳豬飼料是甘藷煮熟後，混合良質麩皮，少量浸過水的粉碎豆餅，少量魚粉或脫脂奶粉，及微量蚶殼粉和食鹽，再放少量水攪拌成泥狀給與。
- (8) 乳豬要常常放出來曬太陽，吃乾淨的土。
- (9) 剛開始吃飼料的乳豬，如在飼料中混合微量的抗生素補助飼料，如「地靈微特補素」、「歐羅肥」等，也可以幫助預防下痢發生。
- (10) 豬舍與運動場上的泥土，應於母豬分娩前更換新土，以免糞桿蟲的發生。