

チンソーダ) ○・五公分，木炭末三公分，重曹三公分，一天分二次給與。

(3) 蘇爾美 (スルメット) ○・五公分，木炭末三公分，一天分二次給與。

這裡所開的是生後一個月後乳豬每頭每日用藥量，較大或較小的豬，可以酌予增減。

給藥的方法：①將藥品研細，混合均勻，放在小容器內，加少量水，攪拌成爲泥狀，用湯匙灌入小豬嘴內。②灌藥時助手將仔豬的兩前腳抓住，頭部向上，等牠的口張開時，將準備好的藥投入牠的舌根部，等牠吞下後才放牠下去。③開始吃飼料的小豬，可將藥物混合在飼料內給與。

注射治療

列藥品，效果很好。

病狀嚴重，服藥效果不大，或給藥困難時，可以注射下

(1) 膿胺美拉淨 (スルフアメラチン，日製ロメチン，臺製スルフコム等) 每日二・五立方公分，一次打完。

(2) 蘇爾美注射劑：每次○・五立方公分，每日一次至二次。

本省製造的「混美能」、「治炎能」等，效果也很好。如同時內服與注射治療，效果最好。

四、怎樣預防？


(1) 哺乳母豬不可給與過多的濃厚飼料或腐敗飼料。

(2) 哺乳母豬應給與適量的青飼料 (甘藷藤、青菜、青草等) 及鈣質 (蚶殼粉) 和維他命類 (魚肝油及其他維他命)。

(3) 哺乳中的母豬，如發生疾病，應立即治療

式公計估重體豬

培元



$$\text{體重} = (\text{胸圍} \times \text{胸圍} \times \text{體長}) \div 400$$

豬的體重，用稱秤稱最準確。但是當你手頭沒有稱，或是人手不足時，也可用下面的公式，來估計大概的體重。(長度單位用「吋」，體重單位用「磅」) 體長自尾巴基部起，沿着背脊，量至兩耳間的中點。這時，豬頭應向前向下。

這公式用在一百五十至四百磅的豬，比較正確。在一百五十磅以下，或四百磅以上時，必需用下表校正。註：一公分約等於○・三九三七吋，一公斤約等於二・二磅。

體重	校正數	體重	校正數
一五磅以下	七	三三—三五磅	三〇
一〇—一四〇磅	不必校正	三〇—三二磅	四〇
一〇—一四〇磅	不必校正	二五—二七磅	五〇
一〇—一四〇磅	不必校正	二〇—二二磅	六〇
一〇—一四〇磅	不必校正	一五—一七磅	七〇
一〇—一四〇磅	不必校正	一〇—一二磅	八〇
一〇—一四〇磅	不必校正	五磅以上	減

，使及早恢復健康，避免因乳質變化而使幼豬發生消化障礙。

(4) 分

娩豬舍內要保持清潔乾燥，舍內應時常放乾淨的褥草。褥草如被豬糞尿污染，應即時更換。

(5) 除豬舍要保持乾燥，供給清潔褥草外，冬天必需注意關好窗門。


(6) 剛開始吃飼料的乳豬，要注意飼料配合和調理方法。不容易消化的飼料 (如米糠)，不新鮮的生魚骨頭或內臟，魚粉和脫脂奶粉等，都不可給與太多。

(7) 最好的乳豬飼料是甘藷煮熟後，混合良質麩皮，少量浸過水的粉碎豆餅，少量魚粉或脫脂奶粉，及微量蚶殼粉和食鹽，再放少量水攪拌成泥狀給與。

(8) 乳豬要常常放出來曬太陽，吃乾淨的土。

(9) 剛開始吃飼料的乳豬，如在飼料中混合微量的抗生素補助飼料，如「地靈德特補素」、「歐羅肥」等，也可以幫助預防下痢發生。

(10) 豬舍與運動場上的泥土，應於母豬分娩前更換新土，以免糞桿蟲的發生。



(門窗的舍豬好關意注要天冬)