

下田檢查，特別注意下部葉片，如發現有病，應儘早施藥。等病勢變厲害才施藥，就不容易見效了。

防除菸草白粉病常用而有效的藥劑，有「硫化鉀」與「可拉生」二種。

(1) 硫化鉀 ①發病初期，可用四百至五百倍液，每隔七至十日噴佈一次。

②病勢嚴重時，應摘除病勢嚴重的葉片，並每隔二至三天噴佈一次。

③噴藥後遇雨，應重新噴佈一次。

④清晨及傍晚噴藥。

⑤採收前十日起停止噴藥。

⑥不可與殺蟲藥劑混合使用。



本刊上期的綜合報導中，曾刊有防治蔬菜害蟲不可用劇毒性有機磷一稿，目的在引起農友們對這一方面的注意。在最近幾天的報紙上，仍然可以讀到，因食用噴射過劇毒農藥的蔬菜，引起中毒的地方新聞，可見得這還是一個問題。這種傷害人畜性命的情形，如果繼續發生，一定會引起

請農友們特別注意

不可用劇毒農藥殺茶蟲

馬拉松

一般人對蔬菜的恐懼，不敢輕易購食，結果會影響蔬菜的銷售，受損失的還是種蔬菜的農友。在政府制訂法令禁止以前，最好農友們自動禁用。
馬拉松(富粒多)、PM、固殺松、安特靈四種藥劑，毒性都極劇烈，前二種滲透力特強，後二種延毒性經久不消，如不慎沾着皮膚而未立刻用肥皂水洗淨，吸入體內，或間接入口，都會使人畜中毒死亡。若隨便用以防治蔬菜害蟲，極為不妥，必須嚴禁。

防治蔬菜害蟲，可用殺蟲效力可靠，而對人畜毒性輕和的藥劑，如魚藤、DDT、BHC、靈丹等。農友們如要用較強烈的殺蟲劑，可用大利農或

治療作用，③遇烈日曝曬，易生藥害，④容易在菸葉上留下硫黃氣味。

(2) 可拉生 「可拉生」是防治菸草白粉病的特效藥。

使用一千至一千五百倍液，全成熟期內，最多噴用三次，便可有效地防治白粉病。至採收前兩週，停止用藥。通常，發現病徵後施藥一次，以後等病徵再現時再施用。

「可拉生」能殺滅已生長的病菌，噴藥後不致有任何氣味或微量藥分遺留，也沒有藥害。

上述兩種藥劑，大約每十公畝(一分地)菸田施用八至十大斗。

註：硫化鉀是片塊狀的固體，黃褐色，黃綠色

內，「土葉」誤排為「上葉」，特此更正。

馬拉松。

本省蔬菜因季節、市價、供求情形等原因，沒有一定的收穫期。噴射在農作物上的劇毒農藥，需要經過相當時期，受陽光、雨水、氣溫的影響，才能分解變為無毒(安特靈延毒性特大，可殘留至三個月以上)。在田間蔬菜尚有劇烈藥毒時，即採收食用，很可能傷害自己家人及家畜。別人購買到這種蔬菜，不知道有毒質存在，沒有充份洗淨就做茶餚，也不免引起中毒。所以，隨便應用這類劇毒農藥，防

治蔬菜害蟲，實在是害己害人，有損道德。

為了農友們自己的利益，與其等待政府嚴厲禁止，不如儘早由農友們自動禁用，互相勸導，互相監督，更為澈底，請各地農友特別注意，並廣為轉告鄰近的親友。

本刊資料室

特別注意，並廣為轉告鄰近的親友。

特別注意，並廣為轉告鄰近的親友。

特別注意，並廣為轉告鄰近的親友。

更正啟事

本刊八卷廿一期第八頁「防病害種好菸」一文內，「土葉」誤排為「上葉」，特此更正。



藥農毒劇射噴可不菜蔬