

冬季養豬須知



江清海

一、準備溫暖的豬舍

- (1) 豬舍應向南或向東南，使冬天的太陽，一出來就照到豬舍裡面。
- (2) 向南或向東南的豬舍，後面的窗戶、門縫等，都應用稻草、草袋、麻袋、木板，或塑膠布等遮掩，以免冷風吹入。
- (3) 豬舍週圍，會阻礙陽光的樹木或草堆等，都應修剪或拆除。
- (4) 豬糞尿要每天清除乾淨。
- (5) 在豬舍床面較高的一角，放置若干乾稻草或乾草，做為褥草，使豬躺在褥草上休息，保持溫暖。

(6) 有些農友，怕豬受涼，就把豬舍四面八方都封緊了。這樣豬舍內缺少陽光照射，空氣流通又不好，對豬的健康反而是不好的。

二、運動可以促進健康

- (1) 為促進豬的健康，必需把豬放到外面，使做適當的運動，並曬太陽。
- (2) 小豬與種豬，更需適當的運動。

三、母豬久不發情嗎？

冬天的母豬，容易變得發情微弱，或久不發情。所以，對母豬應特別注意下列各項，使能繼續發情生產。

- (1) 使母豬做適當的運動。
- (2) 給與足夠的青飼料。
- (3) 注射荷爾蒙。

不發情的母豬，注射二—三萬單位發情荷爾蒙(露巴爾、荷巴荷爾蒙)，就可誘發發情。

發情微弱的母豬，於發情三日前注射二—三萬單位發情荷爾蒙，發情就可增強。

發情後，可照常配種，受胎，生產。

四、預防初生豬凍死


天氣太冷時，請照下列幾點，預防初生豬凍死。

死。

- (1) 準備木箱、木箱，或「米籠」等，裡面鋪適量的碎布、麻袋或稻草。
- (2) 產下的小豬，一隻隻擦乾後放入箱內，上面再覆蓋麻袋等保溫。
- (3) 天氣特別寒冷時，可用酒瓶裝熱水，放在碎布(麻袋或稻草)下面，增加溫度。
- (4) 全部生出後，放出來哺乳一次。哺乳後，再放進箱內。
- (5) 以後每隔一至二小時再哺乳一次。
- (6) 五至六日後，小豬較不怕冷時，就可放出，使隨母豬生活。

五、注意飼料的配合

- (1) 冬季飼料，要富於營養，容易消化。甘薯(甘薯簽)、樹薯簽、麩皮、豆餅、花生餅、米糠等，都是理想的冬季飼料。
- (2) 飼料的配合必需平衡。
- (3) 飼料中蛋白質的適當含量如下：
 - ① 小豬與哺乳母豬：百分之十五至十七



(運動可以促進健康)

？見意麼什有你

高雄市林秋錦讀者，與王進生先生討論 結球白菜育苗新法——練床育苗

豐年編輯先生：貴刊第八卷廿期第十頁刊載的王進生先生大作「結球白菜育苗新法」，使我感到很大的興趣。關於這個方法，我想補述兩點如下：

一、練床育苗的利用 練床育苗，不但結球白菜，就是夏期播種的甘藍、白菜以及移植困難的蔬菜（西瓜、胡瓜、越瓜、及裏作的豌豆等），都可以利用。

二、簡便的播種法 ①用飯碗的底部，壓在每一土塊面上，使成圓形的淺溝（如圖一）。
②把消毒過的種子四五粒，平均播在淺溝內，然後覆土。（如圖二）

③因播種溝的深度均一，發芽整齊，而且間拔時，留存株根部也可以減少傷害。


高雄市 林 秋 錦 謹啓

王進生先生看過林先生的信以後，提出下列三點：


①練床育苗的利用範圍相當廣，但比普通育苗法費工，所以，苗株較大，根群再生力較強的蔬菜（例如胡瓜），通常都不用這個方法育苗。豌豆也不必用練床育苗。越瓜因播種時期的氣溫很適合苗株生長，也無需用練床。夏天當可利用於甘藍、番茄，及結球白菜育苗，以提高成活率。

②為使播種深度均一，使用飯碗的底部在每一小方塊上壓成播種溝播種，是很好的方法。但如每一小方塊為 6×6 公分時，因方塊過小，最好改用茶杯底部。如方塊為 6×6 公分，當可使用飯碗底部。

③至於間拔時損傷根部一節，因練床育苗是很精密的育苗法，不論用不用碗底壓溝播種，都不大會損傷苗根。間拔時最需注意不可損傷的，是留存株的莖葉，而不是根部。



溝壓碗底用：一圖



溝播內溝在：二圖

- ②中豬：百分之十二至十四。
- ③肥育的大豬與休產中的母豬：百分之十。
- ④蛋白質飼料，普通是用植物性的（如豆餅、花生餅等）。如能加些動物性蛋白質，如魚粉、脫脂奶粉等，對豬的發育與繁殖，有較多幫助。
- ⑤注意多給青飼料。冬天甘藷藤的生長較

差，最好改種「茄菜菜」，代替甘藷藤。「茄菜菜」在冬天生長很好，產量又多，是很理想的冬季青飼料。又冬天盛產甘藍菜，花椰菜，結頭菜及蘿蔔（菜頭）等，這些蔬菜的廢棄莖葉，也可以利用做青飼料喂豬。

⑥不要給冷的飼料。

六、容易發生的三種疾病

(1) 感冒 豬舍潮濕、過冷，褥草污穢，都會引起感冒。還有一種流行性感胃，是由細菌傳染的。

病豬發熱，流黃白色或白色鼻涕，有時咳嗽，食慾減低，倦睡不喜活動。

感冒雖然不是致命的疾病，但容易引發其他較嚴重的疾病。

發現病豬時，應儘速隔離，供給多量乾淨的褥草，注意保暖，使安靜休息，並即請獸醫治療。

(2) 胃腸炎 胃腸炎因受涼或採食不良飼料而引起。病豬瀉痢，食慾減低，有時嘔吐。體溫有時升高。

發現病豬後，應多鋪褥草，設法使豬舍溫暖，使病豬安靜休息，並請獸醫給藥治療。在治療期中，應多給輕鬆飼料，如麩皮等。

(3) 乳豬白痢症 請看上期本刊「注意防治乳豬白痢症」。

△農業小智識▽

△人工採精，每頭公豬每次可採精液二百立方公分左右。母豬人工授精，每次只需用精液三十至五十立方公分。

△採取的精液，在注射給母豬前，都先經過仔細的檢查，不好的精液都不使用。

△「漢布夏」豬肩部有白色帶，所以也有人叫做「白帶豬」。對這種豬種有興趣的，可向竹南大埔臺糖種畜場，或臺中區農林改良場畜牧課接洽。