

稻米紅白兩色

自然雜交所致

【問】：請問水稻同株有白米和紅米二種，這是什麼原因變成的。(白河楊惠傳)

【答】：水稻糯米顏色有白、紅兩色，係因引種時將紅米混入稻中，然後遺傳及自然什交分離所致。(余慶東)

水稻除草前追肥

遇雨可減損肥分

【問】：水稻施肥後，忽下了一陣大雨，田水高漲，請問所施的肥料是否有效？(臺南縣東山鄉林振榮)

【答】：這需要看施肥時間過久，及肥料種類，與施肥方法如何來決定。如係

表面施肥，當天遇雨，田水高漲，確會流失約80%，過磷酸石灰約50%，氯化鉀10%。若除草後施用追肥，遇大雨後，肥分會比前項損失一倍左右。若除草前做追肥即時攪拌入土壤內，損失就只有前項之一半程度。(余慶東)

中耕除草肥損少

水稻倒伏應扶起

【問】：據說水稻開始第一次除草前，將追肥施下後實行中耕除草，肥料比較不能流失，是嗎？關於水稻開花出穗時，受風雨而造成倒伏，可以用人工來束縛立起否？(臺南縣下營鄉洪明發)

【答】：追肥後即時中耕除草，將其肥料攪拌耕土內，當然肥分損失較少，並不是絕

對無流失。又水稻在開花期以後倒伏，應即扶起結縛，每四株束在一起，如有附著泥土，應該洗淨。(余慶東)

甘藷須鉀肥增產

人糞尿勿施過多

【問】：①栽培甘藷，多量施用人糞尿有什麼害處？為害情形怎樣？②常施氯化鉀於缺鉀肥田地，土質會否受殘留氯的影響？對澱粉質作物有害否？(彰化縣溪州鄉陳來成)

【答】：①甘藷係根莖作物，產量與鉀肥有密切關係，故鉀肥之施用反較氮肥為重要。人糞尿之肥份雖鉀磷均含有，但以有機物及氮為主。適量之氮肥可增甘藷產量，但多量施用人糞尿，即氮肥過多時，甘藷莖葉

繁茂，諸形細長，結果收量減低。②氯化鉀之施用，除供給鉀養分外，其遺留之氯因一般植物需要量極少，故施用氯化鉀時，氯為一廢物。當施用之則此種廢物殘留過多，對土壤之影響為增加土壤溶液之酸性，多量之氯，對澱粉質作物如甘藷之影響，為增加纖維，影響澱粉之形成，故品質及產量均蒙其害。(梁鉅榮)

甘藷葉腐植化

肥效大於乾竹葉

【問】：乾甘藷葉與乾竹葉經腐熟後，那一種肥分較多？(雲林土庫吳其男)

【答】：兩者的肥分價值，大部存在於有機的腐植質內。甘藷葉較易於腐植化，肥效較著。(梁鉅榮)

分類廣告

△本網廣告費廿五元，每行六號字九個，每行收費六元。

△廣告費請利用郵政劃匯寄下。

△電話接洽請撥四七一三一。

△來稿請在出版期兩星期前寄到。

讓售

臺林農園

特價廉讓

育成鳥梨苗山橙苗在水梨廠接時用作根砧酸枯苗數枝大水梨苗大血肉李苗相思樹苗大量供應請洽新竹縣關西鎮惠慶路三號

純種陸地鴨

開名世界新品種陸地鴨鴨種幼雛出售、本園飼養二百餘隻其產卵率均超過九成欲購函雲林縣斗六鎮虎尾溪斗六種鴨園張深文

陸地鴨

品種優秀提早產卵，產卵率萬，母雛九元公雛三元，無雛別五

純種陸地鴨

新竹唯一供應種鴨鴨欲購函竹北鄉東平村番子寮21號林祺松

純種陸地鴨

世界著名純種陸地鴨幼雛及種蛋廉售飼養簡便收益豐厚原參考資料備函屏東縣新鄉鄉新坪村賴慶壽即寄

徵求

雲林縣西螺鎮中山路卅二郵政劃撥儲金一三八六一電話：六九

徵求葡萄藤

(限由結果枝剪下) 請函品種數量價格臺北縣三峽鎮三峽路五九劉煜煌

白兔

毛皮每張拾元收購熟兔義南北榮街八號黃煥祥

營業

甜柳橙二年生良苗保證品種壯實收效歡迎比較惠顧。中日合作強力多產系繁殖種苗：洋菇、平菇、香菇、草菇。歡迎訂購。廣合農林研究所

雲林縣西螺鎮中山路

卅二郵政劃撥儲金一三八六一電話：六九

木瓜荔枝

奉贈栽培法

木棉

奉贈栽培法

木瓜荔枝

奉贈栽培法

木棉

奉贈栽培法

速效氮肥

豐牌 銨 鈣 N₂20%

花連氮肥股份

有限公司出品

其他產品：

①硝酸銨 80% ②硝酸銨 80% ③硝酸銨 80% ④硝酸銨 80% ⑤硝酸銨 80% ⑥硝酸銨 80% ⑦硝酸銨 80% ⑧硝酸銨 80%

葡萄苗

美日雜交改良種適合臺灣氣候、栽

酸橘苗

一年生數萬株廉售。臺北縣士林蘭雅里八十一號

新芳農園

莊輕烟

鴨地陸

本園自開始出信以來蒙各機關各大農場各位農友惠顧至今不勝感荷。自今起繼續供應種蛋種雛。歡迎訂購。詳細說明書函索即寄。嘉義縣新港鄉宮後街50號陸海種鴨園

卵岩谷系

350小雞分選種雞均47年初由日本岩谷種雞場直輸入三代以上三百卵以上記錄之原種雞卵以上山豬湖二五福山農場主徐普福

Dr. SALSBUARY'S 美國養雞名藥 徵分銷商

REN-O-SAL 利爾素 預防球蟲病，刺激生長，保健。

POLYSTAT 保力使大 防治盲腸炎，防止痢疾及腐蝕，保健。

SULQUIN SOLUBLE POWDER 蘇爾奎藥粉 防治球蟲病，主治急性霍亂病。函索樣品，請附郵票每份一元，並請指定藥名。

臺灣區總經理 安定行 臺北市郵政信箱第4082號