稍輕。

等高耕作及橫條間栽，是水土保持各種方法中，比較容易做到的，所以，這兩種方法，有時也是值得建議農民去做的。

寬壩階段，就適宜在大面積及緩坡上實施。

平台階段優點最多

從上述幾種方法的比較，可知平台階段雖然成本較高，暴露底土部份較大，但可以在本省大多數坡地上應用，且能比較有效地控制冲蝕。其優點如下：

①平台階段適於臺灣農民小面積耕地及其耕作方法。

②平台階段在陡坡地，只要土層較深，就可構作。

③平台階段假如築成內斜或圍以土埂，可較其他水土保持方法貯存更多的水分。這樣不但可以減少逕流，預防冲蝕及泛濫，並且能增加既土的水分，爲作物利用。

④在滲透性良好的土地上，平台階段圍土埂，就不需要出水口。所有雨水都可吸入土內。但在滲透不良的土地上，就必需設有出水口。

⑤平台階段由於儲蓄雨水的能量較大，所以比寬壩階段及橫條間栽，更能抗拒豪雨而不致造成災害。

* * * * *

母猪母牛產後常見的四種疾病

季培元



（1）**產後停滯**　母猪、母牛在產後一定時間（牛六至八小時，猪十五分至一小時左右）胎衣仍停留不排出，稱爲產後停滯。本症多發於牛，患畜的陰門外有一部胎衣，像繩子懸垂，背彎，尾舉起，時作排便狀。久後，胎衣開始腐敗，發生惡臭。體溫上升，食慾減退。

療法：①在繩狀胎衣上，懸垂鐵錘，使胎衣自然剝離。②或灌注大量消毒溫水於子宮內，促使子宮收縮，胎盤分離。

（2）**產後不能起立**　母畜產後不能站立，食慾消退，反芻異常，便秘。

療法：臥處敷多量藁草，畜舍保持清潔乾燥，時時轉變體位，摩擦腰部，腰部行溫罨法。

（3）**子宮脫出**　產後數小時內子宮脫出，患畜不安，食慾減低，反芻失常，時作排便狀，尿糞稀少。

療法：①用百分之〇·二至〇·一的石碳鹼液洗滌消毒，檢查有無損傷。②排除糞尿，使患畜起立，前低後高俯伏，以冷水或二%之明礬水灌注脫出子宮，使縮小後恢復位置。③最好請附近獸醫施行整復手術及施藥治療。

（4）**產褥麻痺**　常發生於乳牛。患畜不安，輕度興奮，筋肉震顫，步伐不確，眼孔放大凝視。不能起立，體溫低降，四肢發冷，呼吸變慢，舌頭吐出口外，流唾液，反芻停止。

療法：最好請獸醫診治。





彰化縣大村鄉賴大森農友撰稿，農復會顯萬先生潤改。

④賢能的學飽，才人的
誠懇無事作格派不（子架擺）
，忠公正明大人衆知
。選舉出錢開不派

⑤有錢有勢也，派
項選舉各出都來，
村中蟲毒大家知
。（無惡）來亂亂選當一

⑥選舉出，（善改必需改）愛愛着氣風
，（事）代人衆中村着爲
，該應不派分錢開
。出（該應）着士人能賢