

# 我是這樣防除稗草的

本刊八卷十一期刊載「趕緊防除稗草」一文後，曾接到很多讀者來信，講到各人防除稗草的經驗。由此可見，一般農友對稗草是很注意的。下面我們介紹具有代表性的四位農友的來信，並且請中區農林改良場農藝課長余慶東先生，發表對這問題的意見。

編輯先生：治病要治源。水田稗草的主要來源，是裏作田。因裏作時，稗草較小，一般人都不大注意。其實，裏作的稗草，很需要防除。方法是在裏作收穫後，用人工拔除。(彰化縣秀水鄉 王協發)

已成熟的稗草，不可給牲畜吃。如拿來束縛成火把，在夏天點火，用煙驅逐牛舍內的蚊子，剩下的灰可施在田裡增加肥分，就可一舉兩得。(臺南縣仁德鄉 施天德)


第一期作水稻田如果耕犁三次，就可以除去稗草。方法如下：第一次與秧田同時耕犁，耕犁耙平後，田水不可過滿。過了兩個星期，等稗草長到一臺寸左右時，開始第二次深耕。再過半個月，開始第三次深耕，然後插秧。這樣既可深耕，又可除稗。(新竹縣寶山鄉 李明和)

稻田第三次除草時，不容易看見稗草，所以，如太陽在東邊，拔稗草的人應由東而西。如吹北風，應由北而南。這樣就容易看出稗草了。(彰化縣溪州鄉 廖聰發)

## 余慶東先生的意見

農友們常講：「稗仔同米價」。其實，混在稻谷裡的稗粒，雖然可以與米同價出賣，但是因為它的重量很輕，農友們是得不到什麼利益的。相反的，混有稗粒的米，一定不能賣高價錢。另一方面，因為田裡長了稗草，每甲地可能減收二十五公斤以上。

關於上面四位農友所提的意見，我願意在這裡再補充兩點：①請農特別注意在苗床時拔除稗草。因為苗床面積較小，這時拔除，可收半功倍之效。②本田稗草最好在出穗或成熟前拔除。



過年啦，  
力破