

第一期水稻

插秧前的準備



張輝雄

今年第一期作水稻，就要開始插秧了。這裡告訴你，在插秧前必需做好的幾種工作。假如其中有幾項是你往年沒有做到的，希望你今年特別注意做好。假如你有更好的方法，歡迎寫信來互相研究。

注意秧田病蟲害防治

秧田面積較小，病蟲害防治方便，效果也較大。

- ① 插秧前十天，撒佈二千倍的富粒多液。
- ② 插秧前二、三天，盡量除去馬鹿苗、稗草、雜草與異種。

秧苗生育期的追肥

第一期作的秧田，除基肥外，在秧苗生育期間，還需施用二、三次追肥。

- ① 秧苗二、三寸高時，每坪秧田施用四十

公分硫酸銨做第一次追肥。選擇晴天，葉上露水乾後才施肥。施肥前先排水，至傍晚再稍灌水。

- ② 第一次追肥後一星期左右，施第二次追肥。肥料用量、施肥方法，都與第一次一樣。假如秧苗生育良好，第二次追肥可以省去。

- ③ 插秧前二、三天，除去稗草、雜草、異種後，每坪秧田再施用一百至一百五十公分硫酸銨，增進秧苗的活力。施肥方法與第一次一樣。

秧苗已到插秧期而本田灌溉水不足或遇天旱，可能延誤插秧時，秧田應停止灌水，而噴撒硫酸銨水。每坪秧田用硫酸銨一百五十公分，溶於三、五公斤的水中噴撒。

本田必需全層施肥

- ① 插秧前十日左右，本田灌水，用刈耙來回二、三次耙碎土塊，再用手耙耙平田面，然後將堆肥均勻撒佈於田面。

- ② 至插秧前三、四天，將鉀肥、磷肥，與三分之二的氮肥，均勻撒佈於田面，用牛犁翻入土中，然後用刈耙耙一次。


- ③ 插秧前一天，用手耙耙細田面，再用蓋筒蓋平，第二天便可插秧。

- ④ 本田每公頃的標準施肥量如下：堆肥一萬二千至一萬八千公斤。硫酸銨三百到四百公斤。過磷酸石灰一百五十到二百公斤。氯化鉀八十至一百公斤。

這裡所說的，是標準的施肥量，農友們實際應用時，可以拿這數字做參考，再參酌當地



③ 阿祿某廷某(妻夫)年過
，錢用少祖拜單簡
，(博嗜)遂跋愛年過柳阿
。(光輸)了了輸金獎有所



② 阿祿某因其原因
，慧賢真買褲衫做添
，襪鞋買褲衫做添
，柳阿是塗糊人做
。酒燒飲招相友朋



① 年終獎金八百元(元)
，(子妻)某因交返領祿阿
，柳阿叫個一外另
。友朋尋金獎了領

阿祿新年真歡喜
阿柳受傷兼來了錢

丙王文
壬酉圖

的情形增減。

請事先準備

適用的正條密植器

本省常用的正條密植器，有車輪式與竹式兩種。

車輪式正條密植器用法簡便，工作效率較高，但是在缺水地區，就難使用。

竹式正條密植器適用於缺水地區，使用時不須排水。

竹式正條密植器的株行距是固定的，所以你要先決定株行距後，才去選購或定做。

車輪式的，可以隨時調節輪間的距離，劃

出適當的株行距。

株行距與每株枝數

正條密植的株行距與每株枝數，要看品種、施肥量、氣溫、秧苗的粗細和強弱來決定。根據試驗結果，每坪栽植六十四株（即株行距各七·五寸）、七十株（八寸×六·四寸）或七十五株（八寸×六寸），每株枝數三至五枝最爲理想。

一般說來，株行距各七寸半，每坪插六十四株的密度，最爲方便。

每株枝數，分藥性強的品種，用健苗三、四枝，普通品種用良苗四、五株爲理想。

△ 插 · 秧 · 小 · 知 · 識 ▽

▲ 採苗時，應與防風牆平行順序採取，以免同一田區內，栽植了生育程度不同的秧苗，以致生育不齊。

▲ 苗根長度，以〇·六寸爲理想。假如剪得過短，生育與收量都不會好。

▲ 插秧深度，以〇·五至〇·八寸爲適當。插秧過深，會減低秧苗的分蘗力，影響初期生長。過淺，秧苗容易浮起，且易被風吹倒。

▲ 採取的秧苗，必須當天插完。

▲ 吹強風或氣溫寒冷（攝氏十二、三度以下時），應避免插秧，以免秧苗受凍害。

▲ 最好在秧苗五、六寸高時插秧。一般說來，晚生品種在五、六片本葉，早生品種在五片本葉時插秧最好。


▲ 稻田應以稻作爲主，絕不可因間作或裏作關係，過早或過晚插秧，而影響稻作的生長。



（〇·六寸以內，度長根苗）



⑥ 阿祿買物兼看戲，
夫妻快樂返去，
阿柳受傷兼了錢，
闊人乎笑大豬（給取笑）。



⑤ 阿祿新年真喜歡，
遊覽名勝（與）街市，
阿柳輸了真正氣，
闊人乎（又）拍（打）小半死。



④ 阿祿夫妻真開通，
相娶北臺去，
柳輸了即發現，
輸先乎（給）人騙。