

農業信箱信件，請在信封上寫「農問」二字，信內寫姓名及詳細地址，以便迅速處理。

不是優良品種

角瓜栽培法

與茄子相同

有何利益？【問】：角瓜（正名黃蜀葵）如何栽培？
【答】：角瓜耐高溫，在臺灣早春或夏季播種均可。行距播，畦三尺，株距二尺，每穴播二、三粒種子，施肥管理與茄同。角瓜苗生後，摘嫩果，切片炒或煮食，味似絲瓜。種子可炒焦磨粉，作咖啡之代用品。在臺灣試栽試驗有希望。（胡昌熾）

春季栽馬鈴薯

下種不可過遲

【問】：我在去年三月十日栽培春作馬鈴薯，係照粵年第七卷二十三期所指導的馬鈴薯栽培方法來作的，每株果然生長良好，但是不能結馬鈴薯，請問這是什麼原因？（臺中縣后里鄉李清源）

【答】：你的馬鈴薯太過於晚播了，因為馬鈴薯塊莖（薯塊）發育最適溫度爲十五至十八度（攝氏）之間。如氣溫超過攝氏二十度時，雖莖葉繁茂旺盛，但因同化作用不平

衡的關係，養分蓄積減少，致塊莖不能肥大。更超過攝氏廿五度時，塊莖不能形成，且容易誘發種種病害。臺灣平地之春季馬鈴薯栽培應在二月中旬以前播種，五月上旬以前採收才能成功。而如要在三月以後播種，則應利用高冷地栽培。（陳文郁）

冬天種蕃茄

應擇通風處

【問】：冬天種植蕃茄，要種在避風處還是通風處？聽說種在避風處者較易落果，是真的嗎？（臺東鎮曾雄輝）

【答】：如無強風，番茄應選通風之處栽培。通風不好之處，病害發生較多，不宜栽培；且避風之處的番茄，第一因會容易患病而引起落果，第二可能會因溫度增高或日照不充足而引起落果。（陳文郁）

嫁接晚崙夏橙

砧木忌用枳殼

【問】：鐵接晚裔夏（バレシヤレト）柑苗，可否用枳殼爲砧木？（宜蘭縣三星鄉朱源茂）

【答】：最好用甜橙或酸橙。或甜橙與枳殼之雜種爲砧木。若用枳殼砧木則生長遲，易落果，產量低。（胡昌熾）

栽培唐昌蒲

注意灌排水

【問】：家植唐葛蒲 *Gladiolus* (グラジ
ラス) 數十株、今發生下列疑問、請賜
○此花長至半公尺左右、葉梢卽有枯萎

現象發生，且二十幾棵幾乎每棵都如此，這有何補救和預防方法？②花謝後隔多久方可取出土中塊根？③植此塊根時應埋多深最爲適宜？（臺北市蔡由之）

【答】：①如能使栽培地排水充分，灌水有定時定量，並充給與肥料，尤以堆肥適量供給後，可以開始此種情形發生。②花凋謝後，在葉片開始變黃時，掘取球根爲最佳。太遲子球容易脫落，太早球根尚未充實。③種植球根深度，以球根直徑之二—三倍爲宜，視土質情形，略爲調整，黏土稍淺，沙土稍深。（鄭達文）

番石榴葉多毛

葉面施肥不宜

【問】：番石榴（拔仔）可否行葉面施肥？
（嘉義縣水上鄉劉木火）

【答】番石榴葉多毛，行葉面施肥不適宜。

番茄着色程度

品種間有差別

【問】：番茄在採收之中，爲什麼不會由青色轉紅色？要怎樣才能使它轉紅呢？（桃

【答】：普通番茄在高温期（攝氏二十五

爲攝氏十五至二十度左右；但靚色之難易，視品種亦有差別。如夏感莖一號在夏季靚色不佳，而夏生種靚色較好。所以夏季栽種番茄，最好選靚色好之品種（如夏生種），或採收後將果實放於攝氏十五—二十度左右之處，使其紅熟。（陳文郁）

黃守瓜的幼蟲

安特靈可防除

【問】：敝人每年於河川中之沖積砂石地面種植西瓜，下種後半個月，每每看到瓜株葉柔軟而至死亡，挖其根部，見有一種蟲，（南部農戶叫鷄母蟲），再延一個月後，又發現瓜株像前一樣死亡，挖其根部，見有幾隻小蟲（其形態請見信中的小紙包）請問用何藥處理？（屏東縣佳冬鄉吳調球）

【答】：爲害你西瓜的小蟲爲黃守瓜幼蟲，可於種瓜前，每公頃以十二磅半安特靈40%可濕性粉和入水中（約二百倍），用酒水

五豐化學工業股份有限公司 與德國拜耳原料在臺獨家配製	農藥聖品	多粒富	殺蟲至寶	甘藍菜藥 菠菜蟲藥 山東白菜藥	蘿葡蟲藥 豆類蟲藥 葱芹菜藥
	Folidol-E605				
	250c.c. 鋁瓶裝				
	1000c.c. 鋁瓶裝				
效力強大	現貨應市	五豐榮藥	農友良	經銷處	
與農業試驗所合作經梁同庭技正指導並經二年試驗				①臺北懷寧街100號二樓五豐公司 電話：31691 ②台北市迪化街1段88號臺灣農產企業公司 電話：44253 ③新竹市中華路228號青果合作社 電話：25 ④臺中三民路114號信全農藥行 電話：3832 ⑤員林中山路229號信全農藥行 電話：184 ⑥嘉義市中山路257號新高藥局 電話：2964 ⑦臺南市建國路2號永豐農藥行 電話：1522 ⑧屏東潮州中山路54號中德農藥資材行	
				歡迎採用	增產發財