


四、及早準備農藥器材

稻熱病在氣溫較高時（攝氏二十至三十度）容易發生。第一期稻作在插秧後三十至七十天之間最易發生葉稻熱病。抽穗前及抽穗後三至五天之間容易發生穗稻熱病。請大家及早準備農藥與器材，密切注意這一段時期中發生病害。使用農藥時，請注意下列三點：

①「谷樂生」與「西樂生」都可以防治稻熱病，但是使用「西樂生」粉劑工作較快。
 ②一般在插秧後第四十、六十、七十天各撒佈一次，共三次，效果最好。或於下葉剛開始發病時，立即撒佈，每隔兩星期撒佈一次。開花期中不可撒藥。

③聽說大多數農友用布袋或手撒佈藥粉，這樣不但效果不好，藥量用得也多。請各位儘量用噴粉器來撒佈「西樂生石灰」。



如何加強第一期作稻田管理 張輝雄

灌溉的要訣

①插秧後四、五日至一週左右，本田應經常保持二至三寸的水深。

②秧苗活潑後，盡量保持淺水，促進分蘖。起初灌溉○.五至○.八寸，以後隨秧苗生長逐漸加深。

③分蘖期終了時，稻田應排水，使田面慢慢乾燥。

④到了孕穗及抽穗開花期，給與充分的水分。通常保持水深三寸，但寒冷地應再加深。

⑤開花後，應逐漸減少灌溉水，黃熟期以後，田水就要排乾。

⑥應避免用冷水灌溉。

怎樣施追肥 ①每十公畝（一分地）準備硫酸銨十二公斤，分成兩半，分別於第一、二次中耕除草時施作追肥。

②施用追肥前需先排水，以免肥分流失。

最好中耕除草四次 ①在插秧後十五日左右，行第一次中耕除草。

②此後，每隔十日再除草一次。

③第一期稻作最好中耕除草四次。

④最後一次中耕除草，最遲也應在孕穗期前舉行。

⑤第一次中耕除草的主要目的，是在中耕，雖無雜草發生，也應舉行。

⑥最好在晴天暖日中耕除草。

⑦第一二次中耕除草時，同時施用追肥。

⑧用手除草比較精細，但用中耕除草器除草，能把肉眼看不見的小雜草，埋沒於土中，尤其在第一次中耕除草時，應用除草器效力特大。稻田缺乏水分，田面較為乾燥時，宜用中耕除草器除草。

注意防除稗草 ①稻田灌深水可使稗草溺死。水溫高時效果較大，水溫低時需時較長。

②稗草應在抽穗前拔除，拔起的稗草必須集中燒燬，不得遺留於稻田。



⑥第一頭雜種豬，要選改良豬，頭項肥快，本省又多，有利時出售，有人氣。

⑤純種公豬，種母豬，或雙性，較有數隻，生活力強，爭相壯健。

④利用工人，授精（在正底在現會農），種純正秀優，公理，兼防疫。