

農業信箱

農業信箱信件，請在信封上寫「農問」二字，信箱內寫姓名及詳細地址，以便迅速處理。

補柑定植三年

可行高接補柑

【問】：將嫁接后定植三年之補柑及海梨柑再更換嫁接為補柑，其方法如何？（桃園縣龍潭鄉黃水有）

【答】：定植已三年的補柑或海梨柑，如欲更換為補柑，可實施高接，鋸截大枝，用切接法接以補柑接穗，時期在一月上旬至二月下旬間。嫁接處離地高度不一定，大概一、二尺間，重要的是選樹皮比較光滑之處鋸斷，以便工作。又分岔上方或下方都可以鋸斷了接，接活後須注意隨時把原來砧木（酸桔）及中間砧木（補柑或海梨柑）上的萌蘗除去，這樣可以促進接穗的發育。（蔡致謨）

【問】：補柑或補柑和晚命西亞甜橙在栽培上那種比較有利？

【答】：①補柑和甜橙（晚命西亞）的市場銷路較佳，但晚命西亞甜橙一系統較優良；②何處可以買到品種可靠的晚命西亞甜橙苗木？

【答】：①補柑、補柑和晚命西亞甜橙三者如能栽培成功，都能獲利，其中以補柑和晚命西亞甜橙獲利較補柑為高。

【問】：金柑仔有幾種？什麼地方栽培最多？其果實除做蜜餞外，有否別的使用途或價值？

【答】：金柑仔有幾種，什麼地方栽培最多，其果實除做蜜餞外，有否別的使用途或價值？

【問】：晚命西亞橙有早生、晚生等系統，以晚生系統為優。

【問】：如欲購買苗木請向彰化縣永靖鄉五福村新高種苗圃洽詢。

【問】：「鳳梨」、「盧金剛」等為農復會五年前從美國引進接穗，嫁接在本省幾個特約果農的家裏，現在已經結果，並已繁殖苗木推廣。至於你所指的某苗圃的苗木，是否可靠，請向當地農會查詢。（蔡致謨）

基隆附近多雨 不適栽植甜橙

【問】：在基隆附近栽植甜橙，以何種類較有利且易成功？除甜橙外尚有其他什麼果苗能適合基隆氣候？橫山梨宜栽培嗎？（基隆市仁一路黃德明）

【答】：本省甜橙品種很多，有甜柳橙（印子柑）、雪柑、晚命西亞橙等。甜柳橙味最甜美，但果形小；雪柑果大而豐產，但味稍酸，晚命西亞橙的果實成熟最遲，落花以後須到第二年四月間才熟，那時市上已無柑桔，故風味雖稍酸，但市價很高。這些品種都適於本省各地栽培，但是，甜橙類在二月間開花，基隆地區這時是雨季，雨水影響授粉作用而減低產量。致於適合基隆氣候的果樹有葡萄、四季種番石榴、柿等。橫山梨也可以栽培。（蔡致謨）

【問】：金柑仔栽培法如何？（嘉義縣大林鎮

【答】：本省之金柑（金柑仔）品種有長金柑、寧波金柑、圓金柑、長壽金柑等四種，各地皆有零星栽培，以宜蘭、新竹等地較多。金柑的用途為生食及做蜜餞，消費量有限，無大規模發展之價值。

【問】：鱒魚繁殖水溫應在攝氏二〇度以下，其最適溫度為七至十一度，在一天之內能代謝一次全池水（即經常有水流動）為重要條件，鱒魚苗本省現在尚無出產，大甲溪放流試驗者是由日本輸入的。鱒魚為冷水性魚類，可與其他冷水性魚類（如香魚）混養。水產試驗所目前正在試驗中的肥料，是化學肥與自然肥的混合，其對象為鱒魚虱目魚之鹹水魚種，所以能否適用於淡水者，尚未有決定性之成果。（曾廣權）

朱乘宏

【問】：①在臺灣栽「杉」，北部成績較好還是南部成績較好？②臺灣是否適合栽種美國紅杉（Redwood）？③甲地方與乙地方天氣若是相同，栽植的樹木（植樹）成活率是否也相同？（臺北縣三重鎮林阿榮）

【答】：①杉木在本省南、北部均生長良好。②臺灣不適于種紅杉。③甲地與乙地氣候相同，栽植樹木之成活率則不一定相同。（甘偉松）

美國種紅杉 臺灣不宜栽

【問】：做地較寒冷，吳郭魚生長太慢，聽說鱒魚能適應，但不知能適應多少水溫？魚苗何處有售？生長快嗎？能與何種魚混養？聽說：水產試驗所已研究出一種肥料，能使魚的收量增加百分之三十，未知是否實事，該種肥料目前有否出售？（宜蘭縣三星鄉李受成）

【答】：鱒魚繁殖水溫應在攝氏二〇度以下，其最適溫度為七至十一度，在一天之內能代謝一次全池水（即經常有水流動）為重要條件，鱒魚苗本省現在尚無出產，大甲溪放流試驗者是由日本輸入的。鱒魚為冷水性魚類，可與其他冷水性魚類（如香魚）混養。水產試驗所目前正在試驗中的肥料，是化學肥與自然肥的混合，其對象為鱒魚虱目魚之鹹水魚種，所以能否適用於淡水者，尚未有決定性之成果。（曾廣權）

【問】：鱒魚繁殖水溫應在攝氏二〇度以下，其最適溫度為七至十一度，在一天之內能代謝一次全池水（即經常有水流動）為重要條件，鱒魚苗本省現在尚無出產，大甲溪放流試驗者是由日本輸入的。鱒魚為冷水性魚類，可與其他冷水性魚類（如香魚）混養。水產試驗所目前正在試驗中的肥料，是化學肥與自然肥的混合，其對象為鱒魚虱目魚之鹹水魚種，所以能否適用於淡水者，尚未有決定性之成果。（曾廣權）

【問】：鱒魚繁殖水溫應在攝氏二〇度以下，其最適溫度為七至十一度，在一天之內能代謝一次全池水（即經常有水流動）為重要條件，鱒魚苗本省現在尚無出產，大甲溪放流試驗者是由日本輸入的。鱒魚為冷水性魚類，可與其他冷水性魚類（如香魚）混養。水產試驗所目前正在試驗中的肥料，是化學肥與自然肥的混合，其對象為鱒魚虱目魚之鹹水魚種，所以能否適用於淡水者，尚未有決定性之成果。（曾廣權）

【問】：鱒魚繁殖水溫應在攝氏二〇度以下，其最適溫度為七至十一度，在一天之內能代謝一次全池水（即經常有水流動）為重要條件，鱒魚苗本省現在尚無出產，大甲溪放流試驗者是由日本輸入的。鱒魚為冷水性魚類，可與其他冷水性魚類（如香魚）混養。水產試驗所目前正在試驗中的肥料，是化學肥與自然肥的混合，其對象為鱒魚虱目魚之鹹水魚種，所以能否適用於淡水者，尚未有決定性之成果。（曾廣權）

【問】：鱒魚繁殖水溫應在攝氏二〇度以下，其最適溫度為七至十一度，在一天之內能代謝一次全池水（即經常有水流動）為重要條件，鱒魚苗本省現在尚無出產，大甲溪放流試驗者是由日本輸入的。鱒魚為冷水性魚類，可與其他冷水性魚類（如香魚）混養。水產試驗所目前正在試驗中的肥料，是化學肥與自然肥的混合，其對象為鱒魚虱目魚之鹹水魚種，所以能否適用於淡水者，尚未有決定性之成果。（曾廣權）

請採用清河春季 優良蔬菜種子

極早生三十天黑葉包心菜子

- 日本黑葉菜美濃大根子
- 淨新粗根北葱子
- 照菜子（大號，小號）
- 全年開花韭菜子
- 白虎杏菜子
- 長種紅仁白格菜豆子
- 長種黑仁黑格菜豆子
- 黑仁青格菜豆子
- 新品種嫩腳豌豆子
- 青皮黃嫩子（正竹竿黃嫩子）
- 紅皮竹竿黃嫩子
- 正烏山淨扁扁圓型豆仔薯子
- 芋種
- 純白葉白骨晚生芹菜子
- 美國派通蕃茄子一、白雪メロン子
- 淨新高仔菜子
- 九葉山東白菜子
- 切葉白菜子
- 加州大粒甜薯莖子
- 淨新白黑仁酸豆子
- 新產品十石大豆子
- 八十天油甘菜子
- 特效農藥，大生粉劑（大生七十八），夏油乳劑（特效）殺菌病最特效藥，可利生粉劑，此外各色優良蔬菜種子及各種特效農藥富積多等在庫均有歡迎賜顧註：做行又於員林新果菜市場，創設金運種子行是清河種子行，員林經銷處，歡迎指教，參觀賜顧是幸。

（定於農曆一月十八日開業）

清河種子行

嘉義市中正路四八五號
電話三五八四號
劃撥儲金第一三二〇七號
嘉義郵局信箱四六號