

小兒麻痺症的預防

亞·藍

根據報上的刊載，在二月份中，臺北市發現小兒麻痺症患者十四名，其中已有兩名死亡。這究竟是一種什麼病症，怎樣傳染，有什麼預防的方法嗎？

幾歲最易得病

小兒麻痺症，在本省並不是近年來才發現的新毛病；早在民國三年時，就有發生此病的報告，不過近年來由於醫藥的普通，引起一般人對這種病的重視。小孩子最易受感染，據統計，六個月到一歲的嬰兒發病率最高，一歲至二歲的發病率次之，四歲以上就比較少了。而且是男孩患病的病例比女孩為多，約為二與一之比。全年都可發生，而以四至七月為最多。


傳染的媒介

這病的病原體，是一種濾過性病毒，因人與人的接觸而傳染，並且蒼蠅也是傳染媒介之一。它的傳染途徑，是由患者的大便或咽喉排洩物中的病毒，經染污的飲水或食物，或經染污的手入口腔，而侵入人體。進入人體後，在腸中繁殖，以後就侵入脊髓或腦部神經

系統，破壞神經組織，輕則手足麻痺，終身殘廢；重則不治死亡。

病狀怎麼樣

濾過性病毒侵入人體後，要經過七至十四天的潛伏期，以後就開始出現各種初期症狀，如流鼻水、咳嗽、下痢、發燒、流汗、頭痛、腹痛、惡心、精神不安等。不過多數患者



，都能在這些現象發生後兩三天便康復。但是有些人則繼續發熱、頭痛、嘔吐和肌痛，少數並有知覺異常，痙攣、頸部僵直、謔語等腦或腦脊髓膜的刺激症狀。以後等到開始退熱，就發現手不能拿東西，或者腳不能動，或者臉部歪曲等麻痺症狀。當麻痺症病毒侵入腦

底的神經細胞，就會發生視力障礙，血壓升高，大小便失禁，或者發生呼吸麻痺等現象，而使患者死亡。

可以治療嗎

關於此症，到目前為止，還沒有適當的藥物可以治療，而且因為初期症狀和傷風感冒極其相像，在初期也沒法區別，所以只有在預防上多加注意。用沙克疫苗可以預防這個病。據試驗結果，沙克疫苗預防小兒麻痺症所收的效果，達百分之七十三。

注射沙克疫苗

沙克疫苗的注射方法是，每人應注射三次。在第一次注射以後的二個至六個星期中，行第二次注射。第三次是在第二次以後，經過七個月至一年時舉行。不過因為沙克疫苗的價格比較高，普通每注射一次約需六十元以上（三次共需一百八十元以上），如果孩子衆多的家庭，在經濟上是一筆很

重的負擔。下面的預防法簡單而易行：

- ① 雙手應保持清潔，飲食前，排便後，必須把手洗乾淨。
- ② 沒有洗乾淨的生菜青果，或者蠅停過的東西，絕對不要吃。
- ③ 盡量避免過勞，身體稍感不適，即應休息或請醫生診治。

還有很重要的一點：就是在這種病流行的時期，不要注射沙克疫苗。

春季

女童

小外衣

- 馮鏡
- ① 雙幅軟毛料一公尺。
 - ② 中型鈕扣四個。



製圖：①本圖適用於八歲左右女童穿著。②袖子在製圖時是前後分別繪好，剪裁時應前後共一塊。③剪裁時計後身一塊，前身左右各一塊，袖子二塊。④袖口留三公分縫份，其他均留七公厘就够了。

縫法：①肩與腋下前後縫合。②前後裡邊肩縫合，再與衣身縫合，縫時與前身左右及後領縫合，然後燙平，翻轉再燙平。

- ③ 前身外面一片鈕孔作好。
- ④ 下擺向裡一折，用瓜架縫法縫好。
- ⑤ 袖下縫合。
- ⑥ 袖口與下擺同樣縫合。
- ⑦ 袖上在衣身袖根上。
- ⑧ 前身裡外一片各釘鈕扣二個即成。

