

黃麻

糊仔
移 植

季景元 施名南

中南部的農友們請注意，這裡給各位介紹兩種特殊的黃麻栽培法——黃麻的糊仔栽培與移植栽培。如果你對這兩種栽培方法有興趣，請先做好各項準備工作。

你的兩期作水田，如果有足夠的勞力，可以在第一期水稻收穫前，把麻苗移栽水稻行間，第二期水稻要插秧時，收穫黃麻。這樣除了正常的兩期水稻外，還可以多種一季黃麻，增加收益。這就是黃麻的糊仔栽培法。

中南部地區，因雨水及輪作關係，無法適期播種黃麻時，可以先找一塊水源方便的土地，設置苗圃，培育麻苗，等到雨水充沛，或作物收成後，再行移栽。如果第一期與第二期水稻中間有七十至八十天的休閒期，也可移栽黃麻，增加收益。這就是黃麻的移植栽培法。移植栽培比糊仔栽培省工，比普通栽培安全。

一、成功的先決條件

(1) 充足的肥料 最好能多備堆肥及人糞尿等自給肥料，以免添購化學肥料，增加生產成本。黃麻移栽田每公頃最少應施二萬公斤堆肥。

(2) 豐勤的勞力 要有豐富的勞力，勤奮的工作精神，才可精密管理，集約經營，獲得良好收成。

黃麻移栽作業，每十公畝（一分地）所用勞力，取苗一工，移栽三至五工，應在事前適當調配妥善，當移栽條件適合時，同一田內必須在一天內完

成工作，提高麻苗成活率。

(3) 足夠的生長期 黃麻生長期至少要一百天，糊仔栽培，除在苗床生長三十至四十天，在水稻行間生長十至十五天外，第一期水稻收穫後必須單獨生長五十天，所以要利用兩期水稻田糊仔栽培黃麻，必須選擇第一、二期水稻夏季休閒期在五十天以上的地區，才有成效。中部彰化、臺中、南投和雲林縣的一小部分，以及高雄屏東地區的兩期作水稻區，可以適合這個條件。如果兩期作水田夏季休閒期有七十至八十天，就可採用移植栽培。


(4) 適當的土地

糊仔黃麻，必須選擇地下水位不高，灌排水良好，有機質含量多，深厚肥沃的植質壤土或壤土栽培。

移栽黃麻用的土地，仍應具備適合黃麻生長的各项基本條件，在旱田更須實施根瘤線蟲病的鑑定，確認土壤中沒有病菌潛藏，才能使用。（基本條件及鑑定法請參看豐年九卷三期第十八頁）。

(5) 前作的適當配合

糊仔栽培時，第一期水稻品種要選稈低矮，堅強，不易倒伏的早熟蓬萊種。現在臺中地區可用臺中特六號或臺中一五〇號



，嘉南地區可用嘉南八號，高屏地區可用高雄一八或二七號。

水稻應該正條密植，普通以行距二十五公分，株距二十公分，最為適宜。

第一期水稻中耕除草時，在預定移栽黃麻的位置，不應如一般習慣，膝行手爬，弄成高低不平。第一期水稻最好在二月上旬插植，俾能預定六月上旬收穫。

(6) 後作的適當配合 為了使黃麻有充分發育的時間，在不影響後作的原則下，黃麻收穫時期應儘量延長。


糊仔黃麻後作如種水稻，在最遲插秧期（立秋節，八月初）前，黃麻必須收穫完畢。第二期水稻如能選取鈍感品種，每叢插植株數應酌量增加，稍晚插植影響也小。

如果第二期作改種甘藷、大豆等，就可以把黃麻的收穫期稍為延遲，增加纖維的收量。移植黃麻與前後作的關係，請看次頁右上角的表。

(7) 適合的黃麻品種 糊仔黃麻的品種在嘉南或高屏地區宜用水上青皮或虎尾青皮七號。中部地區可用臺中特一號，但在稻麻共生期間，麻苗成活後，必須注意排水，以免受到病害的損害。

二、怎樣育苗？

黃麻糊仔栽培與移植栽培，目前的重要工作，



就是培育麻苗。麻苗可以利用普通麻田的間拔苗，或專設苗圃育成。

(1) 利用普通麻田的間拔苗

這是最簡便的辦法，但易受到苗齡粗細和高度的限制，影響以後的產量，所以在選苗前後，應該注意下列幾點：

① 普通麻田，最好多施腐熟堆肥，作為基肥，用寬條播種。

② 發芽後一個星期光景，應在幼苗密集處儘早間拔，使苗間距離保持一至二公分，均勻施用腐熟人糞尿或硫酸銨、氯化鉀等稀薄液肥，作為追肥。

③ 隔一星期後，再除草間拔，苗距定為三公分左右，加施硫酸銨、氯化鉀等追肥，注意灌溉排水，使麻田保持適當濕度，苗間有相當距離。

以行距五十公分，株距十公分來計算，一甲地麻田的間拔苗，可供移植栽培一甲地之用。

(2) 專設苗圃育苗 如果黃麻播種適期，久旱不雨，不能適時下種，就得專設苗圃，培育麻苗，以供糊仔或移植栽培之用。

① 苗圃選定：選擇肥沃的壤土或砂質壤土，附近有水源灌溉和排水方便的田做苗圃。苗床作平畦或高畦，畦寬約一公尺，畦長視實際需要和地形而定。無論糊仔栽培或是移植栽培，苗床面積皆為本


田的十分之一，假定要種十公畝黃麻，那麼苗床面積就需一公畝（前頁圖一）。苗床土壤要充分耕耙攪碎，使畦面細碎平整。

② 播種時期：播種期應按第一期水稻或前作物的預定收穫期來決定。糊仔栽培時，如水稻預定於六月五日收穫，黃麻應於五月二十或二十二日移栽，就要在四月中旬播種。移植栽培時，例如前作物預定在五月十日收穫，五月十五日移栽黃麻，黃麻就應在四月五日至十五日播種（就是將預定移栽期向後推算二十至三十天，即為播種期）。

③ 播種方法：苗床整理完畢後，用尖鋤頭在畦面每隔十至十五公分開一深約一至二公分的淺溝，淺溝與畦面短邊平行（圖二），種子條播於淺溝內，播種後覆蓋厚約一至二公分的腐熟堆肥。土壤乾燥時，應在播種前，澆水在播種溝內。

④ 苗期管理：

種子發芽後，隨時注意間拔，清除雜草，使苗間距離保持二公分左右。追肥在發芽後一至二週施用，每公畝施用硫酸銨二公斤，氯化鉀〇·五公斤，或者酌量施用稀薄的人糞尿。乾旱時可行全面灌溉或噴洒灌溉。苗床表面如固結，要用竹片或尖鋤輕輕地中耕鬆土。



種植大葉桃花心木是

最有利最可靠的投資

苗木種子 售讓

台慶有限公司

臺北市中正路一七八四號
三樓（火車站對面）
電話：二二一四七六

行子種農興北臺

分行

本行 臺北縣三重鎮重新路一段四八號
郵政劃撥四〇二八號 電話四五三三二號

大白柑：……純正優良系統
四十日枝：……僅四十天就可收穫
蕃茄、夏光、馬娜里：……耐熱性品種
六十日早生甘藍：……五月可開始播種
新鳳山白菜：……新選拔的優良系統

● 興林分行已開始為顧客服務，中部附近顧客若對蔬菜、柑橘、病蟲害有何疑問請往興林分行詢問當能得滿意之答覆。

● 求人一、敝行農場需要員工若干人，供食宿，有意者請將履歷表及二吋半身相片，限四月五日以前送本行，供食宿，高中以上畢業，尤其會擔任四健會義務指導員最歡迎，男女不拘，有意者請將履歷表及二吋半身相片，限四月五日以前送本行

彰化縣員林鎮中正路二〇〇號