中南部：第二期稻水期 ← 冬作甘藷 ← 移栽黃麻 ← 第二期稻水期

高屏區：　　 ← 第一期稻水期 ← 移栽黃麻 ← 第二期稻水期

就是培育麻苗。麻苗可以利用普通麻田的間拔苗，或專設苗圃育成。

(1)**利用普通麻田的間拔苗**　這是最簡便的辦法，但易受到苗齡粗細和高度的限制，影響以後的產量，所以在選苗前後，應該注意下列幾點：

①普通麻田，最好多施腐熟堆肥，作爲基肥，用寬條播種。

②發芽後一個星期光景，應在幼苗密集處儘早間拔，使苗間距離保持一至二公分，均勻施用腐熟人糞尿或硫酸銨、氯化鉀等稀薄液肥，作爲追肥。

③隔一星期後，再除草間拔，苗距定爲三公分左右，加施硫酸銨、氯化鉀等追肥，注意灌溉排水，使麻田保持適當濕度，苗間有相當距離。

以行距五十公分，株距十公分來計算，一甲地麻田的間拔苗，可供移植栽培一甲地之用。

(2)**專設苗圃育苗**　如果黃麻播種適期，久旱不雨，不能適時下種，就得專設苗圃，培育麻苗，以供糊仔或移植栽培之用。

①苗圃選定：選擇肥沃的壤土或砂質壤土，附近有水源灌溉和排水方便的田做苗圃。苗床作平畦或高畦，畦寬約一公尺，畦長視實際需要和地形而定。無論糊仔栽培或是移植栽培，苗床面積皆爲本田的十分之一，假定要種十公畝黃麻，那麼苗床面積就需一公畝（前頁圖一）。苗床土壤要充分耕耙攪碎，使畦面細碎平整。

②播種時期：播種期應按第一期水稻或前作物的預定收穫期來決定。糊仔栽培時，如水稻預定於六月五日收穫，黃麻應於五月二十或二十二日移栽，就要在四月中旬播種。移植栽培時，例如前作物預定在五月十日收穫，五月十五日移栽黃麻，黃麻就應在四月五日至十五日播種（就是將預定移栽期向後推算二十至三十天，即爲播種期）。

③播種方法：苗床整理完畢後，用尖鋤頭在畦面每隔十至十五公分開一深約一至二公分的淺溝，淺溝與畦面短邊平行（圖二），種子條播於淺溝內，播種後覆蓋厚約一至二公分的腐熟堆肥。土壤乾燥時，應在播種前，澆水在播種溝內。

④苗期管理：種子發芽後，隨時注意間拔，清除雜草，使苗間距離保持二公分左右。追肥在發芽後一至二週施用，每公畝施用硫酸銨二公斤，氯化鉀〇·五公斤，或者酌量施用稀薄的人糞尿。乾旱時可行全面灌溉或噴洒灌溉。苗床表面如固結，要用竹片或尖鋤輕輕地中耕鬆土。



圖二：黃麻苗床（畦長視需要而定）。

種植 **大葉桃花心木** 是
最有利最可靠的投資
苗木種子 **售讓**
台慶有限公司
臺北市中正路一七八四號
三樓（火車站對面）
電話：二二四七六

臺北興農種子行
本行　臺北縣三重鎮重新路一段四八號
郵政劃撥四〇二八號　電話四五三三二號
大白枝……純正優良系統
四十日枝……僅四十天就可收穫
蕃茄、夏光、馬娜里……耐熱性品種
六十日早生甘藍……五月可開始播種
新鳳山白菜……新選拔的優良系統
◉**員林分行已開始爲顧客服務，中部附近顧客若對，蔬菜、柑橘、病蟲害有什麼疑問請往員林分行詢問當能得到滿意的答覆。**
◉求人一、敞行農場需要員工若干人，供食宿，有意者請將履歷表及二吋半身相片，限四月五日以前送本行。二、敞行需要業務員若干人，供食宿，高中以上畢業，尤其曾擔任四健會義務指導員最歡迎，男女不關，有意者請將履歷表及二吋半身相片，限四月五日以前送本行。
分行　彰化縣員林鎮中正路二〇〇號