


阿花仔



馬鈴薯種薯切塊

怎樣才是最有利？

臺中縣大雅鄉莊全福農友的來信：……貴刊八卷第二十一期刊登過「馬鈴薯種薯的切塊」一文，我想在這裡對這問題，提出一點意見。近年來，馬鈴薯種薯都由日本輸入，價格很貴，如照貴刊介紹的方法切種薯，種一分地馬鈴薯，要三箱以上的種薯，而用我的切法，一分地只需一箱種薯。我的切法如下：

①種薯用濕砂催芽。②待芽長出後切塊。一塊一芽，一個種薯約可切成八至十塊。

鳳山園藝試驗所郁宗雄先生的意見 在本省種薯貴而食用薯便宜的情形下，自應設法節省種薯用量。但是，假設種薯價格倍於食用薯，今如節省一箱種薯而減收三箱以上食用薯時，那就不合算了。事實上用「一芽切塊」的小種薯栽植時，收量必然顯著減低。種薯切塊是不宜小於二十公分的。

使用雙芽甘薯苗

產量真會增加嗎？



臺南縣關廟鄉方得道農友的來信：……一般人種植甘薯，用的都是單芽苗。我想，如果改用雙芽苗，產量一定會增加很多。這種方法，貴刊從來沒有刊載過，請實驗看看吧！

嘉義農業試驗所王俠

？見意麼什有你有

先生的意見 方農友所說的方法，似無實用的價值，理由如下：①雙芽苗培養不易。②畦上外漏部份多，影響成活。③產量即使比用普通苗高，恐怕也是很有限的，何況決定產量的因子，並不止諸苗一項。日人古城會說：夏季甘薯在種植後一個月內，可以提高塊根的產量。這增收的原因，與方農友所提出的方法一樣，然而操作要容易的多，但是到口前為止，還沒有人應用這個方法。

臺北區農林改良場王進生先生的意見 影響甘

諸產量的因子很多，改用雙條蔓，就可增產，雖未有試驗，但頗有疑問，理由如下：①雙條蔓可能形成較多的塊根，但因養分的關係，可能多成為小塊根。②雙條蔓很少，而且多是老化蔓。老化蔓不適於栽植用。

防治乳豬貧血症

投入泥土好不好？

屏東縣佳冬鄉鍾成招農友的來信：……

……去年，我的母豬生了十頭小豬，約三十天後，有二頭發生了乳豬貧血症。貴刊八卷八期登載的「乳豬貧血防治新法」一文說：泥土可以治療貧血症。但是我不敢採用。因為泥土都帶有病菌、寄生蟲等，給豬吃了，一定會傳染疾病或是寄生蟲的。

農復會畜牧組余如桐先生與新化畜產試驗所李邦淦先生的意見 鍾農友這樣小心，是對的。用泥土防治乳豬貧血症，在本省或外國，都已證明是有效的。但是一定要注意使用乾燥清潔的泥土，並且經常（如每月一次）更換，以免發生不良的後果。