

黃麻的整地移植栽培

南名施 · 元景季

中南部地區，因雨水及輪作關係，無法適期播種黃麻時，可以先找一塊水源方便的土地，設置苗圃，培育麻苗，等到雨水充沛，或作物收成後，再行移栽。如果第一期與第二期水稻中間，有七十至八十天的休閑期，也可移栽黃麻，增加收益。這就是黃麻的整地移植栽培法。

我們在前一期裡，已經刊載過這項栽培法的準備工作，如果你已預備好適當的土地與足量的堆肥，並且育得了強健的麻苗，那麼就請按照下面的方法，整地移栽黃麻。

一、整地

①前作物（甘藷或水稻等）於四月下旬至五月下旬收穫完畢後，即將田間整理清潔，均勻撒佈堆肥。堆肥施用量要多，每公頃最少要二萬公斤。

②利用雨水或灌溉，使田間積水後，即行翻耕耙平，排去餘水，等土壤稍乾硬，即可移栽。

③例如灌溉水量較少，可在翻耕耙平後，開挖移栽條溝，將水灌入溝內，等土壤充分吸取水分後移栽麻苗。

二、取苗

取苗時，要注意下面的幾點：

①苗齡不超過三十天，苗高不超過四十五公分（一·五公尺）。

②麻苗生長強健，莖部肥粗，高度整齊，沒有病蟲害損傷。萬一要用高度不一致的麻苗，也應在同區或同行移栽同一高度的麻苗。

③培育麻苗的土地，在移栽前應使含有適當的水分，容易拔取。

④麻苗必須掘住靠近地面的根部拔起。儘量避免頂芽莖部受到損傷。

⑤拔起的麻苗，每四十五株捆紮為一束，如以行距四十五公分株距十公分計算，每束麻苗約可供二平方公尺移植之用。每十公畝（一分地）麻田需五百束麻苗。苗束應在離梢部三分之二，靠近根部的地方捆紮，並且注意不要緊紮。

⑥萬一麻苗拔後一時來不及移栽，應將苗束解鬆，根部向下，直立置放蔭涼處，或浸入淺溝，但在兩天內必須移栽。

三、移栽

①陰天移栽最好，晴天也可以，不過宜在下午三時以後。

②移栽作業和水稻相似，但是麻苗束運到田間後，必須將



圖一：植麻苗的姿勢。



幸福家庭

丙王文
壬西畫

③阿姊教伊怎做人，
（可不）通氣門某廷，
（事懂要）重頭知婦媳人做，
工做多聲吞氣忍。

②小姊妹對訴原因，
（切親不）親無攏婿庭（婆婆）家乾，
真是都氣門常時，
恨怨真念呢日誤。

①某廷冤家（夫妻爭吵）時有，
事識（不）嚟輕年玉阿，
珠阿名姊阿尋來，
（家同快）厝返緊伊勸珠阿。

麻苗梢部向上，放在木盆或竹籬中，以免頂芽沾着污水泥土。

③行距四十五公分左右，株距十公分。最好先用劃行器，照所定距離劃線後移栽。

④移栽方法，左手握麻苗束，右手分取麻苗後，用大姆指和食指拿住根部，中指靠近主根略為伸出根端，與苗根同時插入土中（圖一）。然後輕輕抽起中指，擠壓周圍泥土，使和麻根充分接觸。根部插入土中的深度，應與麻株原來在地下部的長度一樣。（圖二）



。度深入插的苗適：二圖

四、管 理

麻苗移栽後，約經三至四天蘇活，六至七天恢復生長。如果發生缺株，要隨時用比較高大強健的麻苗補植。以後的肥培管理，與普通麻田相同（參閱「豐年」第九卷四期第十頁）。不過在初期應注意下列各點：

①移栽後如遇晴天，隔一天葉片常呈萎萎，頂部下垂，三至四天後，原有葉片大部脫落，僅剩頂芽。這是難免的過程，請不必擔憂。假如連續數日陰天，第一日仍有萎萎現象，二至三天後只下部葉片脫落。

②三至四日後，調查麻田，如頂部伸直，已發新芽，就算蘇活了。蘇活後，田間如有積水，要徹底排去。

③七天以後，應趕速中耕鬆土，加施追肥。

栽·培·晚·崙·西·亞·甜·橙·應·注·意·三·點

黃啓章

肥料要充足 晚崙西亞甜橙因留在樹上的時間長久，消耗的養份較多，所以要用較多的肥料。就是說，較他品種同樹齡的肥料用量，宜多一至二成，他品種肥料的用量請參考農復會編印的：「怎樣改進柑桔生產？」小冊（修訂本）。本省生產的晚崙西亞果實，較美國產的小一點，而且產量低，其主要原因之一，就是施肥量不足，所以應增加肥料，以求改進。

勿過度修剪 假如過度修剪，枝葉過少，發育不健全，結果稀少。注意不可過度修剪。

用高接方法改良品種 本省現在栽培的晚崙西亞甜橙樹，品種不純良的，約佔二至三成。最好在十二月至二月間，選用優良接穗，以高接方法來改良。這方法進行容易，現在農林廳農業試驗所與農復會合作已在臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義及宜蘭等縣，進行甜橙高接工作，在高接之前，可查詢各縣府農林課辦理人員，介紹參觀。



⑥對父母教訓，
賞罰分明，
阿玉要明理，
家庭幸福，
比無樂比。



⑤阿姊苦勸小妹妹，
某庭（妻夫）相敬愛，
某人（兒妻）忍耐，
做家（吵爭）常時，
該不（吵爭）。



④人講百善孝為先，
有公婆（姑翁）孝順，
若孝（不孝）就天，
然當是（姑翁）。