


毒梅的怕可

霖 毓 姚



(大放菌旋螺毒梅)

梅毒是一種很可怕的慢性傳染病。被傳染的人，如不在早期醫治，不但會害了自己的終身健康和幸福，而且還要害子孫。尤其要注意的是不可因為怕被別人知道，就自己看了報上的廣告，隨便買些秘方成藥來吃，這是最危險的。必須請醫師診治，才能迅速痊癒。

下疳是初期的現象

梅毒病原體，是一種螺旋體菌。當螺旋體菌侵入人體後，就寄生在侵入處的皮膚內，形成一個豆狀大小的凸起，很硬，表面潰爛，有黃色分泌物流出，這就是下疳。這種黃色分泌物內，就含有梅毒螺旋菌。下疳是由於與患梅毒的異性性交或接吻而傳染的，在性接觸後要潛伏三星期左右才發生，它好發的部位是陰部及口唇。

二期梅毒的症狀

下起全身淋巴腺炎(腫大)、皮膚玫瑰疹及發癩等。在這個時期，因為患者血內及分泌物如唾液、精液、子宮陰道分泌液內，均含有梅毒螺旋體，故最易在性接觸時傳染給對方。又因為下疳的分泌物內含有梅毒螺旋菌，所以健康的人，如與此等分泌物在性行為時接觸，也會被傳染上。如患有二期梅毒前後的女子，生出來的嬰兒，多患有先天性梅毒。不久就

會現出症狀，如面孔或臀部發生疹斑、骨骼畸形、發育遲緩、牙齒多缺凹，智力遲鈍等，視覺及聽覺也受損害。

三期侵犯神經

第二期梅毒的症狀，就是不加治療，在十天內，往往也會自己消失。症狀消失後，梅毒即進入第二潛伏期。



在第二潛伏期內，梅毒螺旋體即不斷的向頭腦、脊髓、肝、脾及肺等侵犯。經過數年，而發生第三期梅毒。第三期梅毒的症狀，視被侵犯的器官而定。不過大多數患者，腦及脊

髓都被螺旋菌侵害而有神經梅毒的症狀。像有的腹部發生抽搐性的絞痛，雙足及全身時感劇痛，大小便不能自主，有的漸成不能動彈的廢人，但却能生存多年而不死。有的並會發生中風、癱瘓、老年性痴呆、神經錯亂、失明等狀態。

梅毒因為潛伏的時期長，而有症狀的時間很短，所以患者往往就會忽略。同時因為梅毒的臨床診斷不易，所以現在都靠驗血來檢查。尤其是孕婦，為了確保胎兒的安全，產前檢查是必須的。如果患有梅毒的話，早期治療，還來得及。

梅毒怎樣檢查

治梅毒的特效藥

配尼西林，是治療梅毒的特效藥。但是，切不可自己任意用藥，必須要經醫師處方，才可應用。而最好的預防方法，就是避免一切不正當的性行為！

怎樣保護鋁製用具

大 由

燒鹼，非肥皂等，不可放在鋁質的臉盆裡溶解，不然的話，盆面潔白光澤的一層立刻會變黑，並且因為鋁質面上的一層被鹼侵蝕，逐漸減短它的壽命。所以用鹼或非肥皂洗衣服或洗頭髮時，最好用搪瓷臉盆。

鹽酸，硫酸等強酸，不可儲放在鋁碗之中，或澆在鋁器上。鋁遇到鹽酸或硫酸，立刻會放出一陣白色的煙霧狀的氫氣，本身就變成灰白的鋁粉末。如果不小心將酸澆在鋁器上，應立刻用清水將酸沖掉。洗澡和洗衣服時，盆底必須放在平坦的地面上，以免盆底發生凹凸不平的現象，而使盆底裂開，生鋁盆尤應注意。盆裡盛有水或重物，想要搬動時，應將盆底提起搬移，不可用力拖走，以免盆底磨通。

