

黃麻糊仔移植栽培

季景元·施名南

中南部的兩期作水田，如果有足夠的勞力，可以在第一期水稻收穫前，把麻苗移栽水稻行間，到第二期水稻要插秧時，收穫黃麻。這樣除了正常的兩期水稻外，還可以多種一季黃麻，增加收益。這就是黃麻的糊仔移栽法。

本刊九卷七期已經刊載過黃麻糊仔移植栽培的準備工作，如果一切條件都齊備了，請照下面的方法，及時移栽，小心管理。

一、移栽前的準備

(1) 第一期水稻田的積水，應在移栽前一天排去，排水不良的土地，還要開挖排水溝。如稻田原來缺水、土乾，就應預先灌水，使田土澎軟。

(2) 麻田或苗床預先充分灌水，便於選拔麻苗。

(3) 麻苗拔起後，集生長整齊的強健苗每四、五十株為一束，用浸濕稻草捆紮，根部向下，豎置於蔭涼的地方，或流水淺溝中，但在兩天內必須移栽完畢。

(4) 糊仔黃麻的移栽時期，應依下列原則決定：

① 在第一期水稻收穫前十五天，稻穗開始下垂，穀粒進入糊熟時期，稻田可以排水時移植，比較適宜。

② 麻苗務須在播種後三十至四十天內移栽。麻苗過老，會促使開花，提早分枝，生長不良。

③ 苗高約五十至六十公分移栽較好。最好是和第一期水稻株高相近，使在移栽當時可以得到水稻

蔭蔽，較易活着，而活着後可以迅速伸出稻穗上面，接受日光。

④ 應在下午傍晚、陰天、或雨後移栽。

二、怎樣移栽？

① 移栽時，左手握麻苗一束，右手逐一取麻苗，站立移栽於行溝。麻根插入土中，深約五公分，逐行後退移栽。如果田土太硬不容易插入時，可先用直徑二至三公分的木棒鐵錘或手指，鑽深約五公分的小孔後，才將麻根插入，隨即擠壓週圍土壤，使和麻根充分接觸。



② 每兩行水稻移栽麻苗一行，株距為水稻叢距的一半。例如水稻的行距為二十五公分，叢距為二十公分，麻苗移栽行距應為五十公分，株距應為十公分。同田內的黃麻株數與水稻叢數剛好相等。(圖一)

③ 同行麻苗的高度，必需整齊一致。

④ 如果稻株倒伏，要把鄰近的兩行稻梢縛束固定，以免擠倒麻苗。(圖二)

⑤ 萬一麻苗拔取後，一時無法移栽，就要把麻苗根部浸在水溝一至二天，使根部萌發不定根芽後移栽，活着反較容易；但是浸水太久，等到不定根萌發超過一公分才移栽，就容易把根芽損傷，復原



皇牌

中農化互廠出品四大農藥

巴拉松乳劑 採用西德拜耳藥廠原料製造 品質與富粒多相同

PM乳劑 (巴拉松 馬拉松 混合乳劑) 與日本龐巨農藥株式會社技術合作獨家製造 防治水稻螟蟲及其他作物害蟲

馬拉松乳劑 防治蔬菜菓樹害蟲極具效力

混合魚藤精 與 **魚藤精乳劑** 牌子老·藥害低·防治蔬菜·菓樹·茶樹害蟲

總公司：台北市南陽街三四號 電話：三一六六〇 互廠：台北縣景美鎮萬隆里

經銷處：臺北市博愛路63號永裕貿易有限公司 臺中縣霧峰鄉中正路274號正豐農藥行 臺南市南門路二巷4號之1莊培初
臺北市永昌街2號 蓬萊農產行 臺北市漢口街一段23號 大豐農藥股份有限公司