

# 國際的 養雞藥品

已到國際藥效的標準!!

治療預防藥

各種腸胃病·痢疾·呼吸器病·鷄鴨霍亂等

## 安禽素

育雛聖藥·球蟲病·一般痢疾等預防1%治療2%溶水自由飲服

## 樂畜淨素

西藥及中藥的綜合劑

## 新禽寧

發育·生蛋·換羽促進劑

## 利禽素

鷄·火雞蛔蟲·盲腸蟲驅除

Piperazine  
Phenothiazine 合劑

## PP 鷄蟲片

可溶性 (溶于飲水·飼料)

## 可溶性禽蟲素

各地飼料店·藥房·到處均有  
附郵二角贈送「鷄病鑑別表」

國際家畜藥物廠

板橋鎮館前路52號之5

不易，反而有害無益了。

⑥為便利第一期水稻收穫，應預留空道，不移麻苗。

### 三、灌溉、補 植、中耕



。梢稻定固束縛 二圖

①移栽麻苗時，恰好是雨季，所以，麻田如有積水，應當隨時注意排除；但如久旱不雨，下部麻葉凋萎時，應即引水灌溉。

②施用追肥後，不宜立即排水，如果立即排水，肥分就會流失。

③黃麻收穫前半個月，田間的積水，可以不必排除。

④麻苗移栽後三至五天，如有缺株，應該選取

比較強健高大的麻苗，分行或分區補植，使將來同行或同區麻株整齊一致。

⑤糊仔黃麻地雜草不多，但水田土壤比較粘重，應該多行中耕，疏鬆土壤。普通多在施肥前中耕除草。

### 四、其他的肥培管理

①在水稻收穫前，麻苗成活後，應即施用少量硫酸銨等速效肥料，使麻苗生長旺盛，迅速衝出稻穗。

②移栽黃麻後十至十五天，收穫水稻。水稻要儘量低刈，注意不可損傷麻株。

③水稻收穫後，即用狹鋤在黃麻根際開一淺溝，深約二至三公分，施用堆肥和一部分化學肥料，然後挖起水稻殘株，略予細碎後覆蓋。

④隔兩星期後，再在麻株另一側開溝，施用第

二次肥料，培土高約十公分。

⑤如果在施肥後立即碰到豪雨，肥份容易流失，最好能補施抵償。

⑥每公頃總施肥量為堆肥一至二萬公斤，硫酸銨六百六十公斤，過磷酸鈣二百二十公斤；氯化鉀一百公斤。

堆肥和磷肥都在第一次施用，其他分兩次施用，第二次追肥也可用腐熟人糞尿代替。

黃麻生長期施用充分的肥料，不但可以使黃麻豐收，而且可以避免後作水稻發生養分不足的現象。

### 啓事

本刊第九卷第八期第六頁下欄最後一段，柑桔黃龍病「抗病品種的試驗」，據原作者來信，應更正為「抗病砧木品種試驗」。