



阿花仔
阿花仔

你什麼意見？

臺南縣善化鎮蘇明山農友的來信：

貴刊九卷二期「如何改進落花生、棉花、甘藷的間作」一文，大部份都很實用。但是，在棉花傍邊種甘藷一點，我想是不大好的。理由如下：①耕犁棉花時，會犁到棉花根。②牛在棉花田裡犁，會傷害棉花樹株。③人在收穫棉花時，會傷害甘藷。④棉花長大後，會遮蔽甘藷。

下面就是我要建議的間作方法（月份都指農曆）：七月下旬種落花生，到十一月中旬收穫。一月上旬種在來種瓜子，到四月中旬收穫。假如瓜子不能在四月中旬收完，就在瓜子溝施肥，播種棉花。到九月中旬，棉花採收完了，再種甘藷。

徐金玉先生（「如何改進落花生、棉花、甘藷的間作」作者）的意見：

九卷二期所提的落花生、棉花、甘藷間作，是沿海地帶的間作栽培法。在你的地區，是不大適合的。你提出的幾點，都值得討論：

- ①棉花中耕培土，在六月以前就開始，至七月以後的培土，只是再增高培寬而已，不需要中耕。培土時雖然會切斷少數棉根，但是對生育沒有影響。
 - ②棉畦一百二十公分是相當寬的。所以，駛牛培土，不大會傷害棉株。如用小的黃牛，或耕犁機來培土，就更理想了。
 - ③甘藷種在畦上，收穫棉花時，應該注意行走間（壟溝），不要亂踏畦上。
 - ④棉花與甘藷的間作，本來不大理想。但在沿海地帶，這兩種作物的間作期間，只有一個多月，所以，對甘藷生育的影響並不大。
- 最後你想要改進的，是輪作法，而不是間作法。你的輪作法，是很好的。但是在四月中旬（國曆五月中旬）播種棉花，恐怕太早，最好在六月中旬前後播種。
- 臺南棉麻試驗所季景元所長對這問題的看法：
- ①棉花與甘藷間作，甘藷會受棉花的遮蔭，影響生育。因此，採用這間作法，應儘量縮短棉花與甘藷的間作時間。
 - ②蘇農友建議的輪作法，花生的播種期稍晚。花生最好在國曆八月中旬播種。

棉田可以間作甘藷嗎？

種植大葉桃花心木是

最有利最可靠的投資

苗木 售讓

台慶有限公司

臺北市中正路一七八四號

三樓（火車站對面）

電話：二二四七六

防治柑桔病蟲害好消息

瑞士山德士公司出品

- 一、山德士可濕性銅粉 Copper-Sandoz 防治柑桔砂虱、潰瘍、痲瘋、黑心、油胞及小烟煤病等及大豆、洋蔥棉花茶葉等之病害上年農復會已為農民介紹此藥
 - 二、愛克町 Ekatin 最新殺菌乳劑 防治野蠶、紅蜘蛛、潛葉蛾等與體蟲害有效時間可維持兩三星期之久
 - 三、蝸立死 Arinox 為最新殺蝸牛最有效誘餌劑施用本劑可使蝸牛自動就食立死
 - 四、殺也特 Thiovit 殺菌劑防治痲瘋、象皮、油胞、誘蟲、紅蜘蛛最有效劑
- 歡迎直接申請進口，說明書函索即寄
通訊處：請函臺北郵箱 878 號瑞士駐臺代表

唐啓均 接洽