




？見意麼什有係

臺南縣善化鎮蘇明山農友的信：

貴刊九卷二期「如何改進落花生、棉花、甘藷的間作」一文，大部份都很實用。但是，在棉花傍邊種甘藷一點，我想是不大好的。理由如下：①耕犁棉花時，會犁到棉花根。②牛在棉花田裡犁耕，會傷害棉花樹株。③人在收穫棉花時，會傷害甘藷。④棉花長大後，會遮蔽甘藷。

下面就是我要建議的間作方法（月份都指農曆）：七月下旬種落花生，到十一月中旬收穫。一月上旬種在來種瓜子，到四月中旬收穫。假如瓜子不能在四月中旬收完，就在瓜子溝施基肥，播種棉花。到九月中旬，棉花採收完了，再種甘藷。

蘇明山啓

徐金玉先生（「如何改進落花生、棉花、甘藷的間作」作者）的意見：

九卷二期所提的落花生、棉花、甘藷間作，是沿海地帶的間作栽培法。在你的地區，是不大適合的。你提出的幾點，都很值得討論：

①棉花中耕培土，在六月以前就開始，至七月以後的培土，只是再增高培寬而已，不需要中耕。培土時雖然會切斷少數棉根，但是對生育沒有影響。

②棉畦一百二十公分是相當寬的。所以，駛牛培土，不大會傷害棉株。如用小的黃牛，或排耘機來培土，就更理想了。

③甘藷種在畦上，收穫棉花時，應該注意行走間（壟溝），不要亂踏畦上。

④棉花與甘藷的間作，本來不大理想。但在沿海地帶，這兩種作物的間作期間，只有一個多月，所以，對甘藷生育的影響並不大。

最後你想要改進的，是輪作法，而不是間作法。你的輪作法，是很好。但是在四月中旬（國曆五月中旬）播種棉花，恐怕太早，最好在六月中旬前後播種。

臺南棉麻試驗所季景元所長對這問題的看法：

①棉花與甘藷間作，甘藷會受棉花的遮蔭，影響生育。因此，採用這間作法，應儘量縮短棉花與甘藷的間作時間。

②蘇農友建議的輪作法，花生的播種期稍晚。花生最好在國曆八月中旬播種。

？嗎諸甘作間以可田棉

種植大葉桃花心木是

最有利最可靠的投資

苗木 售讓

台慶有限公司

臺北市中正路一七八四號

三樓（火車站對面）

電話：二二四七六

防治柑桔病蟲害好消息

瑞士山德士公司出品

一、山德士可濕性銅粉 Copper-Sandoz

防治柑桔砂皮、潰瘍、瘡癰、黑心、油

脂及小煙煤病等及大豆、洋蔥棉花茶葉

等之病害上年農復會已為農民介紹此藥

二、愛克町 Ekania 最新殺菌乳劑

防治蚜蟲、紅蜘蛛、潛葉蛾等輕微蟲害

有效時間可維持兩三星期之久

三、蝸立死 Artox 為最新殺蝸牛最有效

誘餌劑施用本劑可使蝸牛自動就食立死

四、殺也特 Thiovit 殺菌蟲劑防治瘡癰、

象皮、潰瘍、誘蟲蟲、紅蜘蛛最有效果

歡迎直接申請進口，說明書函索即寄

代表

唐啓均 接洽