

痛苦的淋病

姓 疏 霖

據統計，在城市裡，染有淋病的成年人，數目真不少。在我們談到淋病時，自然就會聯想到不能生育的病來。不育的原因，不論是男方或女方，多半是由於慢性淋病的感染所遺成的。

淋病也和梅毒一樣，多數都是由不潔或婚姻以外的性行為傳染的。平常淋球菌寄生在慢性淋病患者生殖道中，像男性的尿道、前列腺、貯精囊及女性的陰戶腺、陰道、子宮、輸卵管等處。

男性的淋病

如果男性在外面和患有淋病的女子交接後，淋球菌，就會由女方的性腺，進入男性的尿道，經過四天以上的潛伏期，就發生急性尿道炎。急性尿道的症狀是小便疼痛，小便困難，尿道流膿並且有痛苦的感覺。這時檢查膿液，可以發現有淋球菌在膿液中。

急性尿道炎如無適當的治療，時間久了，上面所說的症狀好像漸漸減輕，但是這時淋球菌已向生殖道蔓延了。如果尿道感染不嚴重，雖然可以完全康復而檢查不到淋球菌，但如檢查生殖道中的液體，仍舊可以發現有淋球菌存在。

淋球



初生兒淋菌眼炎

菌侵入生殖道後，漸漸就能使生殖道發炎，使精子不能由睪丸出來，於是男性的精液中就再也沒有精蟲而失去生育力了。

男性淋病，除了可以併發嚴重的不育症外，嚴重的早期淋病尿道炎，還可以併發尿道狹窄，使以後小便成滴狀的流出，十分痛苦。

女性的淋病

患有慢性淋病的男子，精液內都含有淋球菌，當他在性交將精液射入女方陰道內時，淋菌隨即侵入陰道而引起急性尿道炎，併發流膿及疼痛的症狀。

成人淋菌性眼炎，多數發生在淋病患者自己或親屬，這是因為無意中將淋菌帶入眼睛所引起的。患有淋病的婦女，如果還沒有失去生育力，在她懷孕生產時，生產道內的淋菌，就很容易侵入初生兒的眼內，引起初生兒淋菌性眼炎。以前，差不多有百分之九十的兒童，都是由於初生時染上淋菌性眼炎所致。現在因「預防滴

眼法」的普遍施行，比率已大有減少。

預防初生兒淋菌性眼炎，是現在婦嬰衛生上一項重要工作。

預防的方法，是在嬰兒出

生後一、二小時內，用稀硝酸銀液，或配尼西林液滴入眼睛內。但是最好是請醫生或護士擦藥。

如果發現自己有淋病的現象了，那麼趕快去求教醫生。

雞蛋

可以

誘殺

毒蛇

劉樹達

當你在田地或山林裏工作時，遇到了毒蛇的話，如你有能力有胆量，可以用長木棍等工具把它打死。但是如果你害怕，就不要驚動牠，你可以注意牠的行動，等發現了牠躲藏的洞以後，可用汽油灌入洞內，或用木柴或乾草，放在洞口點火燒，就可以把牠燒死在洞裏。

如果怕用火燒而引起火災，或用這種方法不方便時，最好是用雞蛋（鴨蛋亦可）來誘殺。你可以在蛇洞附近，或蛇常常經過的路上，放三、五個雞蛋讓牠去吃，第二次再同樣施行，使牠養成習慣，第三次就可開始誘殺了。就是用雞蛋五個，每個蛋內刺入八支縫衣針，針尖不可露出蛋外，或在雞蛋的一端，輕輕的敲一長方形的小孔，把蛋清和蛋黃好好的吸出，等蛋殼內乾後，每個蛋內放入五片昇汞錠（每片〇.二五公分），用漿糊白紙糊封蛋孔，上面再塗些雞蛋清，等乾後，把蛋放在原來同樣的地方，引誘牠來吃。等蛇把蛋吞下後，由於運動的關係，蛋殼便在體內破碎，於是針尖就可以刺破牠的胃腸，昇汞更能腐蝕牠的消化器官，然後中毒而死。

如果時常有毒蛇在夜裡進屋來偷吃雞蛋，也可以用同法誘殺。

附註：此稿曾請嘉義市毒蛇研究所杜俊敏所長看過，他認為本法可以利用。

