



新城雞瘟疫苗·切勿注入血管

【問】：本人將新城雞瘟疫苗，注射未滿二月齡（欠四天便二個月）小雞，每隻注入○、入、c、注射位置在腿部，不料五七隻小雞，當場注死二隻，如此我覺得該項疫苗之注射實在太危險，以後應如何預防？（臺南縣玉井鄉康爾珪）

【答】：新城雞瘟肌肉用疫苗，含有不溶性微細細菌膠顆粒，注射時誤入血管內，不分雞隻大小均會致死。注射位置應選肌肉豐滿，血管分佈較疎，運動較少的部位肌肉為適。注射於大腿肌肉，如成爲危險較少，小雞大腿肌肉尚未十分發達，粗大靜脈、動脈分佈爲密，且注射時容易動彈，比較容易刺穿血管，仍以注射於胸肌肉較爲安全。又小雞注射時，須注意不能刺穿胸軟骨，使疫苗注入腹腔內，否則也會致死的。注意到這幾點，對於疫苗注射，就不會感到困難和危險了。（劉永和）

注射雞疫疫苗·請照圖示位置

【問】：新城雞瘟疫苗及家禽霍亂菌苗注射的位置如何？何處有售？（花蓮縣志學國民學校薛國才）

【答】：新城雞瘟疫苗須注射胸部肌肉（雞身上肉最豐滿的位置），家禽霍亂菌苗須注射側胸部皮下（羽毛較疏皮膚最顯處）。



新城雞瘟疫苗及家禽霍亂菌苗可用郵政匯票向臺北縣淡水鎮淡水

農業信箱信件，請在信封上寫「農問」二字，信內寫姓名及詳細地址，以便迅速處理。

獸疫血清製造所·臺北縣新莊鎮中正路一九號新與獸疫血清製造所函購。

【問】：本省優良來航雞種雞蛋，可向下列各種畜場洽購：臺中農林改良場（臺中南屯），臺南農林改良場（臺南市東門外），臺南新化畜產試驗所或高雄鳳山農林改良場畜牧場。（李登元）

母牛泌乳漸減·飼料供給不足

【問】：我的母牛生產後半個月，乳量漸漸減少，小牛一天天消瘦，現在想改用人工養育，不知每月要給多少飼料？（嘉義縣民雄鄉）

【答】：母牛生產後不久就沒有奶，是沒有給好的飼料的緣故。哺乳的母牛要給與多汁的青草，同時要補充些谷類飼料才對。你的小牛因沒有奶吃而消瘦，要用人工養育，一個月以後才可以漸漸吃些飼料，每日給與兩把（兩手把）谷類粉飼料，或麩皮、米糠等，頂好將這些飼料用水調成粥狀（水九份，飼料一份）飼與，青草則任牠隨意食。牛漸大時，飼料亦逐漸加多，在六個月斷乳年齡時，每日給谷類飼料約一斤至一斤半左右。（李登元）

稻谷拌靈丹粉·儲藏可防蟲蛀

【問】：谷倉生虫出蛀蟲，施用DDT噴射後經過五、六個月，將谷取出碾成糙米後，發覺變質，白米飯且有味道。請問此種米是否會傷害人體？糠粉可否餵家畜？（臺東縣神岡鄉紀厚）

【答】：稻谷入倉前噴射二五% DDT乳劑加水二〇倍，追乾後再掃除清潔，然後將稻谷用〇·一二五%靈丹粉一份，和以五〇%份谷充分拌和後儲藏之，可防蟲蛀。但這種種類的糠類不宜餵家畜。至于變味白米僅是霉味，無傷害人畜，米糠等可以餵家畜。（王鼎定）

稻葉展不開·施肥未恰當

【問】：水稻臺中六五號，在秧苗及移植後到第一次除草之時，發育良好，以後經過四、五天發見病症，稻葉發出去未開出來，像葱葉一樣，請問有什麼方法來解救？（高雄三民區潘明石）

Advertisement for agricultural products from 中農化互廠 (Zhongnonghua Mutual Factory). It features illustrations of insects and text describing various pesticides like 巴拉松乳劑 (Dieldrin emulsion) and 馬拉松乳劑 (Malathion emulsion). The ad includes contact information for the factory and its distributors in various locations like Taipei and Taichung.

