

農業信箱

新城雞瘟疫苗·切勿注入血管

【問】：本人將新城雞瘟疫苗，注射未滿二月齡（欠四天便二個月）小雞，每隻注入○、入c，注射位置在腿部，不料五七隻小雞，當場注死二隻，如此我覺得該項疫苗之注射實在太危險，以後應如何預防？（臺南縣玉井鄉康爾珪）

【答】：新城雞瘟肌肉用疫苗，含有不溶性微細細菌膠顆粒，注射時誤入血管內，不分雞隻大小均會致死。注射位置應選肌肉豐滿，血管分佈較疎，運動較少的部位肌肉為適。注射於大腿肌肉，如成爲危險較少，小雞大腿肌肉尚未十分發達，粗大靜脈、動脈分佈爲密，且注射時容易動彈，比較容易刺穿血管，仍以注射於胸肌肉較爲安全。又小雞注射時，須注意不能刺穿胸軟骨，使疫苗注入腹腔內，否則也會致死的。注意到這幾點，對於疫苗注射，就不會感到困難和危險了。（劉永和）

注射雞疫疫苗·請照圖示位置

【問】：新城雞瘟疫苗及家禽霍亂菌苗注射的位置如何？何處有售？（花蓮縣志學國民學校薛國才）

【答】：新城雞瘟疫苗須注射胸部肌肉（雞身上肉最豐滿的位置），家禽霍亂菌苗須注射側胸部皮下（羽毛較疏皮膚最顯處）。



新城雞瘟疫苗及家禽霍亂菌苗可用郵政匯票向臺北縣淡水鎮淡水

農業信箱信件，請在信封上寫「農問」二字，信內寫姓名及詳細地址，以便迅速處理。

獸疫血清製造所、臺北縣新莊鎮中正路一九號新興獸疫血清製造所函購。（劉永利）
優良卵用種雞 請詢各試驗場

【問】：本省優良來航雞種雞蛋，可向下列各種畜場洽購：臺中農林改良場（臺中南屯）、臺南農林改良場（臺南市東門外）、臺南新化畜產試驗所或高雄鳳山農林改良場畜牧場。（李登元）

母牛泌乳漸減·飼料供給不足
【問】：我的母牛生產後半個月，乳量漸漸減少，小牛一天天消瘦，現在想改用人工養育，不知每月要給多少飼料？（嘉義縣民雄鄉）

【答】：母牛生產後不久就沒有奶，是沒有給好的飼料的緣故。哺乳的母牛要給與多汁的青草，同時要補充些谷類飼料才對。你的小牛因沒有奶吃而消瘦，要用人工養育，一個月以後才可以漸漸吃些飼料，每日給與兩把（兩手把）谷類粉飼料，或麩皮、米糠等，頂好將這些飼料用水調成粥狀（水九份，飼料一份）飼與，青草則任牠隨意食。牛漸大時，飼料亦逐漸加多，在六個月斷乳年齡時，每日給谷類飼料約一斤至一斤半左右。（李登元）

稻谷拌靈丹粉·儲藏可防蟲蛀

【問】：谷倉生虫出蛀蟲，施用DDT噴射後經過五、六個月，將谷取出碾成糙米後，發覺變質，白米飯且有味道。請問此種米是否會傷害人體？糠粉可否餵家畜？（臺東縣神岡鄉紀厚）

【答】：稻谷入倉前噴射二五% DDT乳劑加水二〇倍，迨乾後再掃除清潔，然後將稻谷用〇·一二五%靈丹粉一份，和以五〇%份谷充分拌和後儲藏之，可防蟲蛀。但這種種類的糠類不宜餵家畜。至于變味白米僅是霉味，無傷害人畜，米糠等可以餵家畜。（王鼎定）

稻葉展不開·施肥未恰當

【問】：水稻臺中六五號，在秧苗及移植後到第一次除草之時，發育良好，以後經過四、五天發見病症，稻葉發出去未開出來，像葱葉一樣，請問有什麼方法來解救？（高雄三民區潘明石）

中農化互廠出品四大農藥

巴拉松乳劑 採用西德拜耳藥廠原料製造 品質與富拉多相同

PM乳劑 (巴拉松混合乳劑) 與日本隆巨農藥株式會社技術合作獨家製造 防治水稻螟蟲及其他作物害蟲

馬拉松乳劑 防治蔬菜葉樹害蟲極具效力

混合魚藤精與魚藤精乳劑 牌子老·藥害低·防治蔬菜·葉樹·茶樹害蟲

總公司：台北市南陽街三四號 電話：三一六六〇 互廠：台北縣景美鎮高隆里

經銷處 臺北市博愛路63號永裕貿易有限公司 臺中縣霧峰鄉中正路274號正豐農藥行 臺南市南門路二巷4號之1 莊培初 臺北市永昌街2號 蓬萊農產行 臺北市漢口街1段23號 大豐農藥股份有限公司