


用藥，爲了大家的安全，更要慎重。蔬菜要能照治蟲專家指示的施用



(•用可不都藥農何任，內天四前收採菜蔬)

農藥的應用，在本省已極爲普遍，農友們渴望知道這一方面的新知識。

新農藥對害蟲的撲滅，證實具有驚人的功效。使各種作物產量增加，品質提高，成本減低。無論是對生產者或是對消費者來說，都有很大的利益。但是有些農藥含有毒質，藥力非常強大，農友應用時，爲了自身安全，必需十分小心。尤其是對蔬菜

請農友們小心應用農藥！

農友們應用農藥，爲了自身安全，必需十分小心。尤其是蔬菜用藥，爲了大家安全，更要特別注意。只要遵照專家的指示，應用正確的農藥種類，按照正確的濃度與施用時期，就不會發生意外，也不會使蔬菜含毒。

種類，濃度與時期的安全規定，正確的應用農藥，就不會發生意外，也不會使蔬菜含毒。

另一方面，農藥的研究工作，也是很重要的。如何適當的應用農藥，以增加農產，如何防止亂用濫用農藥，以避免得到相反的結果。這些技術問題，專家們無日不在研究中。我們如得到可靠的最新

材料，就立刻在本刊上發表。我們盼望有關當局重視這個問題，對於劇毒農藥的製造銷售等，從速訂出切合實際的規定，採取適當措施，以確保農藥應用的安全。同時，我們也深切盼望農友們用藥時，一定要按照規定的方法，以免發生意外，還希望大家注意本刊發表的有關農藥的文章。



(上菜蔬在用以可不對絕靈特安)

蔬菜病蟲害的防治

本刊前一期，刊有「蔬菜治蟲當心用藥」的報導，提出目前菜農們應該注意的四點，即是：一、「安特靈」絕對不用在蔬菜上，「阿特靈」和「地特靈」祇可以防治菜園土壤害蟲。二、蔬菜收穫前四天內，任何藥劑都不可用。三、蔬菜收穫前三個星期內，祇用「馬拉松」或「純魚藤精乳劑」。四、蔬菜生長初期可用「安特靈」，「地特靈」以外的其他藥劑。至於那一種藥劑防治那一種害蟲，怎樣稀釋，請參看附表：

藥劑名稱	防治害蟲	藥劑名稱	防治害蟲	藥劑名稱	防治害蟲	藥劑名稱	防治害蟲
可利生粉劑	大生粉劑	25% DDT 乳劑	10% BHC 乳劑	3.5% 純魚藤精乳劑	5 E 馬拉松乳劑	40% 阿特靈可濕性粉劑	每一分地一臺斤
1:1000	1:400	1:1000	1:500	1:500	1:800	每一分地一臺斤	防治病蟲害名稱
白粉病	茄疔病、炭疽病、	茄褐紋病、黑斑病、番茄疫病、白疫病、露菌病	黃跳葉蚤(跳仔)、菜心螟(食心蟲)、擬尺蠖(青蟲)、夜盜蟲、豆野。	鱗蟻(鷓母蟲)、金針蟲、蟋蟀(土猴)、夜盜蟲、螻蛄(肚爬)、白蟻。			