

P.M乳劑的二千倍液一至二次。捕殺成蟲或採取卵塊，也是有效的防治方法。因為秧田面積較小，防治的效果比較大，千萬不要拖到插秧後才防治。

拔除病株稗草 秧田裡的馬鹿苗、稗草、雜草，及異品種等，應在插秧前二、三日巡視秧田，澈底拔除。

新竹地區的優良蓬萊稻種

張萬來



新竹五六號

①以前叫做新竹育

七三號。適宜在中等肥沃，而且能避風的壤土水田栽培。

②生育日數第一期作為一百一十九日，第二期作為一百零一日。

播種適期第一期作為一月中下旬，第二期作為七月上旬。

④插秧適期第一期作為二月下旬至三月上旬，第二期作為七月下旬。

⑤收穫適期第一期作為七月上旬，第二期作為十一月上中旬。

⑥對各種稻作病害都有很強的抗病性。

⑦施肥量可以視情形增加。⑧本品種是晚熟品種，所以，播種時期應看情形提早，以便配合後作栽培。

新竹五三號

①以前叫做新竹育二一號品種。是早熟品種。

在新竹地區等比較缺水的地方，只能在短期間內有充分的水量，或準備埋作時，最適合栽培本品種。

②肥沃的砂質壤土最為適宜。

③生育期間怕強風吹襲，應該注意防備。

④生育日數第一期作一百一十三日，第二期作為約八十七日。

⑤播種適期第一期作為二月上、中

旬，第二期作為七月上中旬。

⑥插秧適期第一期作三月中旬，第二期作七月下旬至八月上旬。

⑦收穫適期第一期作為六月下旬，第二期作十月下旬至十一月上旬。

⑧不可施用過多的氮肥，防止病害發生及早期倒伏。

⑨分蘖期間較短，插秧時，每株支數應較一般晚熟品種的支數增加一至二支，每枝插植五至七支。

⑩追肥應較一般晚熟品種提早施用。

⑪第二期作栽培時，應多施鉀肥，分蘖終期晒田一次，預防菌核病發生。

⑫播種前應消毒稻種，並用硫酸銨水選種。

新竹五五號

①就是以前的新竹育七二號，應選擇水利良好

，灌溉排水方便，而且能避風的壤土水田栽培。

②生育日數第一期作為一百一十九日，第二期作為一百日。


③播種適期第一期作為一月中、下旬，第二期作為七月上旬。

④插秧適期第一期作二月下旬至三月上旬，第二期作七月下旬。


⑤收穫適期第一期作為七月上旬，第二期作十一月上、中旬。

⑥可以視情形增加施肥量。

⑦比較晚熟，播種期應看情形提早。



④新式機器可耕深，耕好，用真土培，省真工，能萬萬。



⑤牽牛食草仔，工仔，弄人無，動振沒病會食無。



⑥中一甲愛日，日七，息出着日，食日，直費所免不。