

# 甘藍番茄花菜的夏季栽培

王進生

本省夏季氣候炎熱，栽培蔬菜，容易發生病害，或受驟雨、颶風傷害。

下面告訴你怎樣注意肥培管理，在夏季栽培甘藍、番茄，與花茶（花椰菜）的方法。

## 育苗

七月起可開始播種。甘藍用本地品種，花茶用早生品種，番茄要選種耐熱的品種。

夏季栽培蔬菜成功的第一關鍵，是如何育成強健的茶苗。爲了育成強健的茶苗，必須注意下列的幾點：

**消毒苗床與種子** ①播種前，先用八百至一千倍的水銀劑溶液（如「烏斯普龍」〔ルベロン〕）消毒苗床。

②種子須用千分之一的「賜保根」或「殺滅散」作粉衣消毒。

**多施堆肥** 苗床要多施腐熟堆肥，使土壤通氣良好，苗根發育旺盛。

**防雨及遮蔭** 夏天驟雨多，幼苗期受驟雨打擊，幼苗莖葉破傷，容易傳染病害，或引起幼苗根部腐爛。

所以，從播種到本葉三、四葉時止，必須架設防雨架，防止驟雨打擊。通常可搭離地六十至九十公分高的竹架，上面覆蓋綠色塑膠布。

綠色塑膠布，不但能防雨，且能使地溫較裸地減低攝氏三至四度，使幼苗生長良好。

爲避免塑膠布被風吹下，可在塑膠布上再蓋網。

菜苗本葉三、四葉起，除下雨天外，應盡量除去塑膠布，使植株能够晒到太陽。

## 本圃管理

本圃應設在能避免強風，排水良好的地方。因爲各種地下害蟲在夏季發生較多，所以，除前作栽培水稻的水田外，必須徹底消毒土壤，撲滅地下害蟲。

**消毒土壤的方法**如下：九百公分「阿特靈」，與二百四十公斤水混合攪拌，用噴壺灑注土壤後，耕起勻平。「阿特靈」很毒，調製時，注意絕不可用手攪拌。

這樣消毒後，黃條跳虱及夜盜蟲等地下害蟲，都可全部殺死。

下面分別說明這三種蔬菜的管理要點。

**甘藍** ①夏季容易發生根腐病。爲了預防發病，應該多施腐熟堆肥，植穴不可開得過深，並且要注意本圃的排水。

②灌溉要用畦間灌溉。在晚間（九時以後），等溫度降低後灌溉才好。

**番茄** ①番茄不耐濕，所以，本圃須要排水良好。

②本圃要採用高畦，並且多施腐熟堆肥。

③地面應敷蓋稻草或麥稈三至五公分。

④疫病、葉霉病可在發病

每隔七天再噴射一次，連續三至四次。

⑤開花時期溫度過高，授精不好，爲使結實良好，提早上市，必須用「番茄多旺」（トマトーン）一百倍液處理。每一花叢開三至四個花時，用手將花叢浸漬於「番茄多旺」一百液液中的一至二秒就可。浸漬時間過長，或藥液濃度過濃時，果形容易變壞，必須注意。

每瓶「番茄多旺」，大約可處理四百株番茄，十公畝（一分地）需要四至五瓶，每瓶價錢十八元左右。用「番茄多旺」處理，雖然花錢費工，但是必須處理才有好的收成。


**花茶** ①花茶比甘藍更不耐土壤濕度，容易發生根腐病。所以，本圃必須多施腐熟堆肥（十公畝三千公斤）。

②植株動搖，根部破傷，也會引起根腐病，所以，本葉八、九葉時，應斜插短支柱，拴縛植株，防止根部動搖。

③在花蕾開始出現時，葉面噴射百分之〇·三至〇·五的尿素液，能使花蕾肥大，增加產量。



（搖動防止支柱搖動）



（架雨防用苗育）

前噴射一  
大生「四  
百倍液防  
治。以後