

王明樟
蘇鴻基

這種病害，可以用藥劑，或改進栽培貯運的方法，加以防治。下面提出本省常見的五種香蕉果實病害，以供大家參考。

病徵 本病最顯著的病徵，通常在果實成熟，果皮變黃後發現。

果皮上起初呈暗褐色或黑色的斑點。這斑點漸次擴大而稍凹陷，然後數點斑點融合，果實表面變為黑色，且略皺縮。

不久，病斑上形成多數橙紅色黏狀點；這是鑑別本病的重要特徵。（圖一）。

炭疽病是香蕉果實病害中，最可怕的一種。在臺灣，整年都可發生，高溫高濕時，蔓延特別厲害。通常在收穫前已被感染。

防治法 (1) 爲了防止病菌侵入幼果，當幼果上的花落下後，必須儘早噴射「波爾多液」。

噴射「波爾多液」，對防治黑星病也有效果。

(2) 最好栽植抗病品種，例如爪哇種 Hijam S-82, Iotyon 等。

(3) 收穫時，絕不可傷害果皮。

(4) 收穫的果實，可用攝氏十一度的溫度冷



。病疽炭：一圖

藏。如果溫度過底，反而有不好的影響。

黑星病

病徵 果實表面現出很多大約一公厘的黑褐色小隆起。小隆起又往往密集一起，而變成黑色雀斑點，使果面粗糙。本病影響果實的外觀，對果肉沒有影響（圖二）。

本病不單在果實上，就是在植株上也會發生。幼果被害時，發育受阻，果肉稍為硬化。蕉葉受害時，光合作用受影響，蕉株生長受阻。

防治法

噴酒

又套紙袋，就可減少爲害

軸腐病

病徵 病菌由果梗、指座，及果柄等傷口侵入，然後蔓延到內部組織，使果軸腐爛。

有時，病菌由植株的地下部傷口侵入，而引起根腐病。

多濕時，病勢加重。攝氏十六至十九度時，發病猛烈。臺北一帶，冬季發生特多（圖三）。

(1) 盡可能避免果梗、指座、果柄

等受傷。

號八八四第利專局準標央中部濟經

◎親愛的農友們！
每逢播種有感及困難嗎？

請使用源順播種機
使用源順播種機
輕快省工笑微微



業農進改化械機

堅固耐用。	作播種種子，數目正由用。第二機	子種錢，省工時每公畝可節省工費一	同、覆土砂石堆地三畝、播種適用作	大豆皮可小豆、豌豆、或百花玉生豆、米豆、類、畜大	一、本機的性能
-------	-----------------	------------------	------------------	--------------------------	---------

號 用來用去真正好
請您大家着相報

源順機器工廠

廠址：花蓮市中華路一八號・電話六七五號
 郵政劃撥金一一八四號
 土地銀行申請底利貸款

水稻增收特效藥



促進發根 健康幼苗
增加分枝、增加產量
每甲一仟保證增收

トマトトーン
(蕃茄多旺)

殺草劑二・四—D 石原

殺蟲殺菌劑

中農化工廠出品：パラチオン、P M、マラソン、其他各種備全
※説明函索即寄（請附郵票四角）

石原産業株式會社總代理

大豐農藥股份有限公司

臺北市漢口街一段二十三號 電話二六五三八號