

當心孩子誤食毒物

近幾年來，由於化學物品或藥物（包括農藥）等的普遍使用，許多家庭常常發生誤食毒物的悲慘事件，尤其是無知的孩子受害最多。重的多中毒身死，輕的也使孩子受到一番痛苦的折磨，即使能僥倖脫險，也常遺留下永久性的損傷。

避免發生意外

差不多每個家庭裡都有着火柴、香煙、樟腦丸、煤油、汽油、阿斯匹靈或各種擦皮膚病的藥膏等東西。這些對大人來說是很普通的，但是對於孩

子却都是有害的毒物。還有許多農藥，殺鼠藥，殺蟻藥，殺蜂藥等更都是十分危險的毒物。就是這些東西，常在不知不覺中毒害了許多孩子，做父母親的還能不加注意嗎？

有毒藥品放高處

爲了避免這種不幸事件的發生，做父母的應該格外當心，凡是家庭中所有能使孩子中毒的東西，或農藥等，都應該仔細地處理。

凡是對孩子有毒的化學品或藥品毒物，都須放在比較高

油炸香蕉

香蕉六根、白糖少許、麵粉二大匙、花生油半斤。（以上各量，都可以自由增減）。

香蕉剝皮，切成一分長小段或半公分薄片均可。麵粉用適量水和成麵糊狀（注意不要太稀）。

花生油倒鍋中，用大火熬熱。

將每段香蕉放入麵糊中，使香蕉外面滿沾麵糊，取出放油鍋中，榨至顏色金黃時，就可起鍋。用白糖蘸了吃，香甜酥軟，別有風味。

而孩子拿不到的地方；對於比較大的孩子，最好詳細告訴他們藥物的毒性及危險性。較小



而不懂事的孩子，就根本不要給他們知道。

劇烈的毒物（例如：殺鼠藥、農藥），一定要放在絕對安全的地方，並且還要加鎖。用後切記歸還原處，再確實鎖好。

無用藥品早燒毀

已過期或失效的毒物或藥品，應早日棄掉，最好燒毀或埋在地下深處。裝毒物的空罐子也應同樣處理。

裝有藥品毒物的容器上，必須畫上醒目的記號，或貼上

標籤，最好寫上紅字，以示警惕！

千萬別把有毒的東西和食品放在一起，更不要放在廚房或飯廳裡。

告訴每個孩子，在外邊的時候，除非是得到大人的許可，不要去嚐試任何東西；常有些孩子誤吃野生的（或附有農藥的）菜蔬而不幸中毒。

除去了。

洗衣服

蠟及燭油：用吸水紙或毛邊紙，蓋在上面，再用熱熨斗隔紙熨過，蠟或燭油就會溶化而被吸水紙吸去。

血蹟：血蹟染在衣上時，首先將血蹟用微溫水浸透，然後用肥皂和熱水洗淨，就可以除去了。

鵝毛扇

• 料 陳 •

材 料

細竹一支，約七台寸長。粗鵝毛或鴨毛二十餘支（視扇之大小而定）。粗鐵絲五台寸及二台寸長各一條。

作 法

(1) 先將細竹離上端一吋及三台寸處各鑽一小孔，孔之大小以能穿過鐵絲即可。

(2) 在各支鵝毛管近頂端鑽一小孔，再上去二台寸處也鑽一小孔。

(3) 先把鐵絲穿進細竹的小孔中。

(4) 把鵝毛由鐵絲的兩端穿上，穿完爲止。

(5)

鐵絲的剩餘部份，用鐵鉗捲彎，以防止脫落，這樣就完成了一把很漂亮亮的鵝毛扇了。

