

優良蔬菜種子 贈送本刊訂戶

一、結球萵苣

品種：Great Lakes (大湖)

二、胡蘿蔔

品種：Chantenay (五十)

三、洋葱

品種：Granex (勝玉)

以上三種由美國亞洲協會 (The Asia Foundation) 贈送。

四、菜豆 (敏豆)

品種：「臺北一號」

菜豆由臺北區農林改良場採種贈送，專供秋播採種栽培之用。

本刊訂戶，確實需要菜種的，請按照下列次序：①先填寫左下角的表格，剪下或用另紙抄寫都可以。②表格裝在信封裏，信封上寫本人的姓名住址，貼郵票四角。③寫好本人姓名住址的信封，再裝在另外一個信封裏。④封好貼郵票後寄「臺北市中山北路二段四十三號豐年社收」並在外面註明「菜種」二字。每人可以選要兩種。你選定的菜種如已送完，即改送另外一種。本社於八月二十一日開始寄送，先到先送，全部菜種送完為止，不再覆信。來信沒有附郵票及信封的不送。

姓名：

住址：

我要的菜種：

□ 結球萵苣

□ 胡蘿蔔

□ 洋葱

□ 菜豆

(請選兩種，在菜名上的小方格內畫一「」號)

鳳梨園可以間作木瓜嗎？

黃榮瑞

本文作者在鳳山熱帶園藝試驗所，研究鳳梨栽培多年，他根據本省南部的實際情形，提倡鳳梨園間作木瓜，認為這是一種很有利的栽培方式。農友們已經這樣實行過的，歡迎提出實際的經驗。如有人對於這種栽培方式，有什麼意見或是問題的，歡迎來信討論。

——編者

鳳梨與木瓜，都喜歡生長在山坡或排水良好的園地裏。鳳梨是矮性作物，木瓜的樹幹高，無分枝，遮蔭面積小，所以這兩種作物間作栽培，是沒有影響的。

因為鳳梨株數較密，施肥較多，木瓜自然可以得到肥份，所以生長結實，常比單作木瓜較好。

但是鳳梨與木瓜間作，要以鳳梨為主作，木瓜為間作，才可以增加收入。如以木瓜為主作，因為株距過密，蔭處較多，會影響鳳梨生長。

額外收入兩萬元

鳳梨種植後通常需要二年才有收入，期間比他作物較長。成本高，投資收回的期間又長。

木瓜的生長期間，較鳳梨早約一年。鳳梨園間作木瓜，不但可以縮短資本收回期間，並可增加收入。

例如鳳梨照原定株行距已有種植，每公頃增加間作木瓜五百株，並不影響鳳梨的產量。每株木瓜每年約可產二十至三十公斤果實，每公斤以一元二角計算，每年可增額外收入壹萬元至貳萬元。

選擇好品種

鳳梨優良品種的條件為果實大，基部無着生疣

目，裔芽少，吸芽發生早，葉透無刺等，例如正常開英種等。

木瓜品種優良條件為糖分充足，肉質硬軟適度，果肉厚，果形大，還要具備特殊的風味。例如蘇魯雜交一號及蘇魯九號，墨西哥一、二號，均為本省現有的優良品種。

本地種木瓜中，也可選出適合上列條件的優良品種。

(本文作者黃榮瑞先生)

春秋播種育苗

鳳梨是取苗繁殖，通常以秋植為普遍。為了配合間作木瓜，應提早播種。秋季種植的，應在五至六月播種。春季種植的，應在十月播種。苗床宜選擇陽光充足之處，高約二十公分左右，注意排水良好。



木瓜播種後，覆土半公分至一公分，以種子不露出為度，然後覆蓋乾草，防止日光直射和蒸發過速。

充分灌水，高溫時播種後一星期左右即可發芽

贈送！

附本廠藥品空袋
或紙盒三個或標頭三張並附郵票
二角，即送一份。
(每戶限贈一份，壹萬份送完為止)



是養

指南針。
的參考資料。

每人一冊
每人一冊 養
每人一冊



方便。
順利。
成功。

手冊目錄概要。

- ※ 母雞開始生蛋的日期。
- ※ 小雞的發育與體重。
- ※ 飼料消費量。雞禽標準體重。
- ※ 產蛋時的生蛋促進法。
- ※ 孵卵與溫度。育雛。
- ※ 飼料配合例。養雞的消毒藥品。
- ※ 飼料的維他命。營養組成表。等

國際家畜藥物廠主要出品

板橋鎮館前路52號之5

已到國際藥效的標準!!

治療預防藥

各種腸胃病、痢疾、呼吸器病、雞鴨霍亂等

安禽素

育雛聖藥·球蟲病·一般痢疾等預防1%治療2%落水自由飲服

樂畜淨素

西藥及中藥的綜合劑

新禽寧

發育·生蛋·換羽促進劑

利禽素

雞·火雞蛔蟲·盲腸蟲驅除

Piperazine
Phenothiazine 合劑

PP 鷄蟲片


各地飼料店·藥房·到處有售

，寒冷時，需要約數星期才能發芽。發芽後即除去覆蓋的草，苗床上注意肥沃鬆軟，排水良好，才能有好的成績。

倒株種木瓜

準備開作木瓜的鳳梨園，可行密植栽培。鳳梨種植後即種植木瓜，或等到第二年春季再種木瓜也可以。

木瓜行距五公尺，株距四公尺，即每四行鳳梨（畦距一公尺，行距五十公分）間作木瓜一株，每公頃大約可間作五百株。



(形情的瓜木植種株倒)

木瓜苗傾斜約三十度種植（俗稱「倒株」），成活後植株較矮，幹莖粗大，結實亦多，耐暴風，管理採果也較方便。

鳳梨種植後，全面施行中耕除草，不可單獨施行一部份。

四五年後更新

鳳梨種植約經二年後開始有收入，第一次產量最多，以後產量漸次減少。種植四至五年後的鳳梨，一定要行更新。

木瓜結果最多的時間，為種植的頭二三年，以後逐漸減少。那時木瓜的植株過高，管理也不方便，易遭風害。所以，約四至五年之後，木瓜也要更新。所以，鳳梨園間作木瓜，大約四至五年之間，可以同時更新，最為適當。

如何決定菸草播種適期

菸草的播種時期，必須與水稻密切配合，所以，菸草的播種適期，應該由水稻的播種日期、生育日數等來計算。下面試舉一例，各位可以如法計算：

假使水稻品種為臺中一八〇號，在七月十日播種，七月廿五日插秧，插秧後八十五天（就是十月二十日左右）收割。因為菸草可以在水稻行間耨仔兩星期，所以菸草應在十月五日至十元左右移植。通常菸草的苗床期大約為三十七至四十日左右，那末菸草可以在八月二十五日至九月一日間播種。如果水稻播種時間提早，菸草也應該提早播種。如果水稻播種時間延遲，晚期菸草應該分別考慮。