

贈送！

附本廠藥品空袋
或紙盒三個或標頭三張並附郵票
二角，即送一份。
(每戶限贈一份，壹萬份送完為止)



是養

指南針。
的參考資料。

每人一冊
每人一冊 養
每人一冊



方便。
順利。
成功。

手冊目錄概要。

- ※ 母雞開始生蛋的日期。
- ※ 小雞的發育與體重。
- ※ 飼料消費量。雞禽標準體重。
- ※ 產蛋時的生蛋促進法。
- ※ 孵卵與溫度。育雛。
- ※ 飼料配合例。養雞的消毒藥品。
- ※ 飼料的維他命。營養組成表。等

國際家畜藥物廠主要出品

板橋鎮館前路52號之5

已到國際藥效的標準!!

治療預防藥

各種腸胃病、痢疾、呼吸器病、雞鴨霍亂等

安禽素

育雛聖藥·球蟲病·一般痢疾等預防1%治療2%落水自由飲服

樂畜淨素

西藥及中藥的綜合劑

新禽寧

發育·生蛋·換羽促進劑

利禽素

雞·火雞蛔蟲·盲腸蟲驅除

Piperazine
Phenothiazine 合劑

PP 鷄蟲片


各地飼料店·藥房·到處有售

，寒冷時，需要約數星期才能發芽。發芽後即除去覆蓋的草，苗床上注意肥沃鬆軟，排水良好，才能有好的成績。

倒株種木瓜

準備開作木瓜的鳳梨園，可行密植栽培。鳳梨種植後即種植木瓜，或等到第二年春季再種木瓜也可以。

木瓜行距五公尺，株距四公尺，即每四行鳳梨（畦距一公尺，行距五十公分）間作木瓜一株，每公頃大約可間作五百株。



(形情的瓜木植種株倒)

木瓜苗傾斜約三十度種植（俗稱「倒株」），成活後植株較矮，幹莖粗大，結實亦多，耐暴風，管理採果也較方便。

鳳梨種植後，全面施行中耕除草，不可單獨施行一部份。

四五年後更新

鳳梨種植約經二年後開始有收入，第一次產量最多，以後產量漸次減少。種植四至五年後的鳳梨，一定要行更新。

木瓜結果最多的時間，為種植的頭二三年，以後逐漸減少。那時木瓜的植株過高，管理也不方便，易遭風害。所以，約四至五年之後，木瓜也要更新。所以，鳳梨園間作木瓜，大約四至五年之間，可以同時更新，最為適當。

如何決定菸草播種適期

菸草的播種時期，必須與水稻密切配合，所以，菸草的播種適期，應該由水稻的播種日期、生育日數等來計算。下面試舉一例，各位可以如法計算：

假使水稻品種為臺中一八〇號，在七月十日播種，七月廿五日插秧，插秧後八十五天（就是十月二十日左右）收割。因為菸草可以在水稻行間耨仔兩星期，所以菸草應在十月五日至十元左右移植。通常菸草的苗床期大約為三十七至四十日左右，那末菸草可以在八月二十五日至九月一日間播種。如果水稻播種時間提早，菸草也應該提早播種。如果水稻需分早晚兩期種植時，晚期菸草應該分別考慮。