


### 最新最好動物用藥品

## 救畜寧 注射劑 100 c.c.




### Hog Star

衛試藥字第0564號

主治：豬、牛、羊，家禽類疾病及預防  
主成份：三種磺胺劑+下熱劑+強心劑

### 禽聖片錠劑

## A.C.M.



主治：雞、火雞、鴨子、鴿子等疾病

主成份：氯徽素+三種磺胺劑

藥房、飼料行、農會均售

## 太平洋製藥廠

臺北市中山北路1段105巷90號 TEL: 47086

## 大生七十八

### 可濕性粉劑三磅美國原裝



### 亦能防治 大豆銹病

大豆常有銹病，發生於生育中後期，當大豆莢果形成時，下部的葉子背面可見散生的褐色斑點，逐漸隆起，繼而破裂。此時振動豆株，利用陽光的反射，可見褐色粉末(即其夏孢子)落下。如果穿白褲在病區中走動，粉末可使白褲染污。病害由下葉開始而延及上葉，早期發生時，豆葉很早脫落，豆莢就不能飽滿，使收成在望的豆園落空。

用「大生七十八」可濕性粉劑加水四百倍，在發病初期(即下部葉發生斑點時)，每隔十天連續噴三四次可收相當效果。如在播種後四十五日即用「大生七十八」，每隔十天連續噴四次，其效果尤為顯著。

臺灣總代理 青象貿易有限公司

臺北市中正路 1756 號三樓 電話：27467

函索農藥說明書附郵票四角即寄



應在整地前施用石灰。

(3) 多施堆肥、磷肥。

(4) 避免使用甘藍和馬鈴薯的跡地。


如要提早收穫趕早市的，應選砂質土壤栽培。多利用水田裡作。栽植初期的蔗田和柑橘園，也適於間作洋葱。

洋葱的肥料，除多施堆肥外，每公頃宜再加氮素一百五十公斤，磷酸一百五十至二百公斤，鉀質一百五十公斤。堆肥作基肥，開溝條施下。磷肥全施在條溝內堆肥上，和堆肥混和作基肥。氮肥和鉀肥的三分之一作基肥，三分之二作追肥施用。最後一次追肥應在葱球開始肥大時施用。

基肥的施法，如用狹畦二行植式時，在畦的中

央開條溝一條施下。如用潤畦四行植式時，在畦的二旁開條溝二條施下。追肥第一次施在株邊，第二次施在行間，第三次施在畦肩，施下後畦肩稍培土，然後灌水將肥料溶入土壤內。

畦的方式，應依土壤的性質和灌水的的方法來決



勝玉(上)與早玉(下)洋葱

定。表土淺薄排水不良的土壤，或用畦溝灌溉時，宜作狹高畦，以使畦土變厚畦面變高。如土層深厚，排水良好的土壤，宜作潤畦，這時如為砂土且只用空中澆水時，宜作平畦。如為壤土或粘土時宜作高畦。又如用畦溝灌溉的，做狹畦較為方便。如用空中澆水的，做潤畦較能保蓄水分。(未完下期續)

### 贈送茶種啟事

本刊贈送讀者的優良蔬菜種子，還剩有結球高苣、胡蘿蔔、與洋葱三種。需要種子的讀者，請按照本刊九卷十五期二十頁的辦法，寫信來要。

要選茶豆的，已經超過預定贈送的數目，請不要選茶豆。

四種茶種中，結球高苣最容易失去發芽力，凡是要結球高苣的，都遲延到九月五日至二十五日才寄出，並且希望收到種子後立即播種。

來信沒有附郵票及信封的，都不覆。