

種菜良優的送贈刊本

# 五寸胡蘿蔔

生進王

「五寸」種胡蘿蔔，適於本省各地栽培，尤其，以砂質壤土最為適宜。根長十三至十八公分，根重一百五十至三百五十公分。從播種到收穫，需九十至一百二十天。

### 播種工作

栽培胡蘿蔔，最要緊的是播種工作。土壤中水分的多少，對發芽率有很大的影響。

播種後下驟雨，土壤水分增加時，發芽率就很低（約百分之二十左右）。在土壤水分含量適宜時（百分之四十五至六十），大約六至七天，就可全部發芽出土。所以，應該選擇排水良好並能保持適當水分的土地栽培。

溫度對於胡蘿蔔的發芽，並沒有太大的影響。在攝氏十八至三十度之間，它都可以發芽得很好。

在乾燥期播種，必須整地後立即下播，並且鎮壓床面，使種子與土壤緊密接觸。九月以後是播種的適期，但在當地氣溫進入攝氏二十度左右的六十天前播種，成績會比較較好。

畦寬一公尺，條播二行，播種條寬十二公分。在河川地帶，較容易乾燥的砂質土，可用平畦，畦寬五至六公尺，行距二十四至三十公分。

這次贈送的種子，每包五千四百粒，重量六.三公分，發芽率百分之九十七。所以有五、二千二百粒可發芽，約需土地〇.三六畝。種子在播種前先用千分之一「賜保根」作粉衣消毒。播種後鎮壓，然後覆蓋稻草，預防過乾及雨水沖打。

### 消滅地下害蟲

胡蘿蔔在生育初期，容易受夜盜蟲及蟋蟀等為害，而致生育不整齊。因此在播種前，應該消毒土壤：每十公畝土地（一分地）用「阿特靈」六百公分，與二百四十公斤水，混合攪拌（注意用竹子木棍攪拌），用噴壺澆土壤，然後耕起勻平作畦。

### 高肥好基肥

本葉二至三葉時，根部開始肥大。這時不可缺肥或缺水。前作曾經施用過堆肥的土地，可不須再施用堆肥。基肥用氮化鈣（鳥肥）為宜。每十公畝約施用七十五公斤，氮化鈣在土壤中不易流失，能在胡蘿蔔生育後期，不斷地供應肥分。此外還需施用磷酸四十公斤（全部作為基肥），氯化鉀十五公斤（作為追肥，分二次施用），尿素二十公斤（作為追肥，分二次施用）。

### 實行兩次間拔

在本葉二葉展開時，間拔一次，使保持五公分左右的株距。本葉四五葉時，舉行第二次間拔，株距十五公分左右。播種後約七十五天，可以間拔大株出售。

咱人有病着要受醫  
王姑那裏會保成



丙王文  
壬西圖

①傳新玉說  
新廟建  
多真客香  
像參日每  
感靈真姑玉說傳  
港新在洞廟建新  
，蜂蜜像多真客香  
。人萬數拜參日每

②大相家  
善信男善  
車包車卡  
市利真車包車卡  
，去港新招相家大  
，此保求女信男善  
。錢（賺）趁大棍神方地

③迷信是在實信迷  
香水聖  
草藥神  
中了食  
，（可不）通無是在實信迷  
，（效功無）工彩無灰香水聖  
，人騙全汁草藥神  
。望無命毒中了食

爲了預防軟腐病發生，不宜與白菜、蘿蔔、胡瓜、馬鈴薯等輪作。白絹病發生地，必須四年輪作一次，或者先栽培一年水稻。在高温乾燥時，本省各地都容易發生斑點病，可以噴射四百倍「大生」液預防。蚜蟲可噴射一千二百倍「馬拉松」液撲滅。

## 珍貴的生食蔬菜 大湖結球高苣

王進生

結球高苣（捲心高仔菜）是很珍貴的生食蔬菜，本刊這次贈送讀者的，是專家們推薦的「大湖」品種。

從播種到收穫，約需九十至一百天，球色濃綠，球重四百五十至九百公分，爲使結球良好，產量增加，請注意下列的幾點。

晚夏至初秋播種 晚夏至初秋播種，應先在冷蔭的場所催芽，然後播種。

種子在播種前，先用千分之一的「賜保根」作粉衣消毒，預防立枯病發生。

播種床用千分之一的水銀劑溶液（如「烏斯普龍」等）消毒，以提高育苗率。

這次贈送的種子，每包一千二百粒，重量一·四公分，發芽率百分之八十，所以約有一千粒種子可以發芽。假定育苗率爲六成，可育成六百株苗。

本葉展開一至二葉時，移植（假植）一次。株距六公分，行距九公分。移植深度不可過深。移植時，儘量避免損傷子葉，以免引起病害，或根部腐爛。

五六本葉時定植 本葉五至六葉時，爲定植的適期。畦寬一公尺，每畦栽四行，株距二十四至三十公分。

定植時，也要注意不可折傷苗葉，不可栽

植過深。根際只可輕輕鎮壓，然後澆水。土地應選富於有機質的微酸性（酸鹼度六·〇至六·五）壤土。容易乾燥的砂質土壤，及地下水位較高的粘質土壤，都不適宜栽培。

不可施用水肥！結球高苣是生食用的蔬菜，所以不可施用水肥。腐熟堆肥施用愈多愈好。每十公畝地（一分地）施肥量，應看各地地方而定。地方中等的施肥量如下：

堆肥三千公斤：全部作爲基肥，注意施用均勻。

尿素二十四公斤：三分之一作基肥，三分之二作追肥。肥分三次施用。

過磷酸鈣四十五公斤：全部作爲基肥。氯化鉀十五公斤：五分之二作基肥，五分之三作追肥。追肥分三次施用。


及時噴藥防治病蟲 爲了預防各種病害發生，定植後一星期起，噴射四百倍「大生」液，每隔七至十天噴射一次。

連續噴射三至四次。爲驅除蚜蟲，在發生初期噴射一千二百倍「馬拉松」液。

蛭蟪應在生育初期，噴射二百五十倍的砒酸鉛液毒殺。



⑥ 咱人（我）們有病着醫要，  
王姑那裡會保庇，  
真多香客車跌死，  
嘉茂（幸）阿林無去趕。



⑤ 厝邊伊勸新港，  
阿潤病的即有，  
但是早票實空（完），  
改醫醫生較省（事）。



④ 年林阿四十四外，  
單孤子叫潤阿，  
阿林庭某（夫）心磨（煩），  
因爲潤阿病大（重）。