

爲了預防軟腐病發生，不宜與白菜、蘿蔔、胡瓜、馬鈴薯等輪作。白絹病發生地，必須四年輪作一次，或者先栽培一年水稻。在高山乾燥時，本省各地都容易發生斑點病，可以噴射四百倍「大生」液預防。蚜蟲可噴射一千二百倍「馬拉松」液撲滅。

## 珍貴的生食蔬菜 大湖結球高苣

王進生

結球高苣（捲心高仔菜）是很珍貴的生食蔬菜，本刊這次贈送讀者的，是專家們推薦的「大湖」品種。

從播種到收穫，約需九十至一百天，球色濃綠，球重四百五十至九百公分，爲使結球良好，產量增加，請注意下列的幾點。

晚夏至初秋播種 晚夏至初秋播種，應先在冷蔭的場所催芽，然後播種。

種子在播種前，先用千分之一的「賜保根」作粉衣消毒，預防立枯病發生。

播種床用千分之一的水銀劑溶液（如「烏斯普龍」等）消毒，以提高育苗率。

這次贈送的種子，每包一千二百粒，重量一·四公分，發芽率百分之八十，所以約有一千粒種子可以發芽。假定育苗率爲六成，可育成六百株苗。

本葉展開一至二葉時，移植（假植）一次。株距六公分，行距九公分。移植深度不可過深。移植時，儘量避免損傷子葉，以免引起病害，或根部腐爛。

五六本葉時定植 本葉五至六葉時，爲定植的適期。畦寬一公尺，每畦栽四行，株距二十四至三十公分。

定植時，也要注意不可折傷苗葉，不可栽

植過深。根際只可輕輕鎮壓，然後澆水。土地應選富於有機質的微酸性（酸鹼度六·〇至六·五）壤土。容易乾燥的砂質土壤，及地下水位較高的粘質土壤，都不適宜栽培。

不可施用水肥！結球高苣是生食用的蔬菜，所以不可施用水肥。腐熟堆肥施用愈多愈好。每十公畝地（一分地）施肥量，應看各地地方而定。地方中等的施肥量如下：

堆肥三千公斤：全部作爲基肥，注意施用均勻。

尿素二十四公斤：三分之一作基肥，三分之二作追肥。肥分三次施用。

過磷酸鈣四十五公斤：全部作爲基肥。氯化鉀十五公斤：五分之二作基肥，五分之三作追肥。追肥分三次施用。


及時噴藥防治病蟲 爲了預防各種病害發生，定植後一星期起，噴射四百倍「大生」液，每隔七至十天噴射一次。

連續噴射三至四次。爲驅除蚜蟲，在發生初期噴射一千二百倍「馬拉松」液。

蛭蟪應在生育初期，噴射二百五十倍的砒酸鉛液毒殺。



⑥ 咱人（我）們有病着醫要，  
王姑那裡會保庇，  
真多香客車跌死，  
嘉哉（幸）阿林無去趕。



⑤ 厝邊伊勸新港，  
阿潤病的即有，  
但是早票實空（完），  
改醫醫生較省（事）。



④ 年林四十四外，  
單孤子叫潤阿，  
阿林庭某（夫）心磨（煩），  
因爲潤阿病大（重）。