



阿英仔
阿英仔
阿英仔
阿英仔

糊仔甘蔗必需補植

——雄國廖 鄉化南縣南臺——



八公分深的地方。
撒佈藥粉時，要順着風的方向，並儘量接近地面，以免藥劑飛散，同時力求撒佈均勻，以免影響蔗苗生長。

在撒佈藥劑後的地面挖溝，將已發芽的蔗苗種植，略加壓土。每隔二日灌水一次，至活為止。

糊仔甘蔗因接受陽光太少，莖苗細長而嫩，好像茅桿一樣，十分脆弱。所以每分地要施硫酸銨二十公斤，促進生長。



反農雄國廖

當二期水稻收穫後，糊在稻田中的甘蔗，因陽光不足，地下害蟲為害，或積水太多，而致蔗莖腐爛的，大約有百分之二，影響將來甘蔗收穫量減產頗大。我用下述補植的方法，減少了這項損失。

蓬萊水稻收成前半月，將補植用蔗苗平放在地上，苗莖上撒一層薄薄的土，促進發芽。


被水浸爛的，或被蟲害的蔗莖，全部搜集一堆，深埋地下，或燒掉，以免再為害新莖。

全針蟲、蔗龜、蟻蛄等為害莖苗、幼莖，使蔗園缺株增多，分蘗延遲或減少，影響產量很大。所以，在全園行小培土前，應先在植溝旁撒佈一% BHC 粉，每公頃四十五公斤，須離蔗根約十公分施下。


有缺株的地方，應把 BHC 粉和土攪均勻攪拌，施用到十二至十八公分深的地方。

防治水稻紋枯病特效農藥

- (一) 日本特殊農藥會社出品モンゼット MONZET 水溶劑 100瓦裝
- (二) 西德拜耳廠出品 TUZET 水溶劑 1公斤裝



現貨供應



效能及施用方法請閱豐年第九卷第十一期第七頁 (備有說明書函索即送)

進口 永松公司 經銷處 錦昌貿易行
臺北市鄭州路二三號二樓 TEL 42003 · 45730