

的 區 地 中 臺

培 栽 豆 大 石 十

— 東 慶 余 —

十石大豆生育期較短，省肥，耐旱，最適宜於臺中受災地區栽培。如果買不到種子，可以種植生育期較長的百美豆。

雙十節前播種

十石大豆，在十月十日以前都可以播種。百美豆必需在九月二十日以前播種。過期播種，產量減低。

十石每公頃需要種子六十公斤，百美豆四十公斤即可。種子在播種前，先用「斯巴貢」拌種，以促進發芽，預防菌核病發生。

水淹地如有半台寸以上的石頭，應該小心檢除，然後作畦。

排水不好的土地，作寬四尺，高四寸的平畦。

畦溝寬一尺。每分地需留四、五條排水溝。

排水良好的土地，可不必作畦，略留排水溝（每分地留三條）即可。

密植點播

十石大豆適於密植栽培；行距一尺，株距四寸，每穴播一至二粒種子。

百美豆的栽培距離較寬。行距一尺，株距六寸。每穴播一至二粒。

不需施用基肥

爲了爭取時間，可不需施用基肥。苗高四寸時，施追肥一次，每分地用量如下：

- 硫酸銨 六公斤
 - 過磷酸石灰 十公斤
 - 氯化鉀 十公斤
- 在株傍條施。

除草二次

施用追肥後，立即施行除草。除草時，順便鋤起行間的土壤，覆蓋在追肥上面。以後，等雜草繁茂時，再除草一次。

小心防治病蟲害

本葉二葉時，撒佈「安特靈」八百至一千倍液一次。以後，隔十八至二十天，再噴「安特靈」八百倍液一次。至開花後再噴第三次。


開花後，如果發生銹病，應即噴射「大生」四百倍液。以後，每隔一星期再噴一次，繼續二次。

「可濕性硫磺粉」價錢比較便宜，防治銹病的效力也很好。使用濃度一百五十倍，用法與「大生」一樣，可向農林廳購買。

使用這兩種藥劑，都要注意噴口向上，噴射在葉背上。

十石大豆

百美豆



(期適種播的豆美百與豆大石十)

野兔時常侵食發芽後的大豆。野鼠也會爲害大豆。



(半台寸以上的石頭，應該小心檢除，然後作畦)

這兩種動物，都應設法防治。

八十天收穫

十石大豆的生育日數(播種至收穫)爲八十五至八十五天。百美豆的生育日數較長，爲九十五至一百零五天。

豆葉枯落，只留頂部兩葉時，爲收穫適期。連根拔除豆株，日晒一天，用竹桿擊打脫粒，再曬二天，就可以收藏。

△農業小知識▽

△在山坡地等高耕作，可以減少逕流或減低逕流的速度，是保持水土的一種簡易方法，但因本省降雨強度大，絕對水平的等高作，反而會造成大害。

△最適合本省的等高耕作是微斜的。微斜的程度，以不超過百分之一(十公尺差十公分)爲宜。

△覆蓋對水土保持的效果很大，據鳳山崗試驗所的報告，鳳梨園用任何覆蓋物覆蓋，鳳梨產量都可增加百分之四左右。