

向東南亞華僑多的地區，及日本等輸出。據說，日本近年仍每年向歐洲等地輸入多量菜子，本省如能供應，必定受到歡迎。但是在外銷時，必須注意品質一致，價格低廉，並且能長期供應。

新的油菜品種，今年在新竹、苗栗、桃園、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義等縣推廣。栽培農戶，請特別注意下列的兩個事項：
① 加強病害防治：大面積栽培時，比較容易發

生病害，要加強病害的防治。花謝後，尤其應該注意。

② 使用展着劑：油菜莖葉表面光滑，農藥不容易粘着，爲了提高農藥的效力，必需加用展着劑。

臺中區農林改良場印有「油菜栽培法」小冊一種，有需要的農友，請附郵票二角，寫信到「臺中市向上路臺中區農林改良場」去要。

今年六千甲種子已經分配完了，希望明年栽培的農友，請預先向各鄉鎮農會登記，申請配發種子。註：展着劑可用「山本マンノ」展着劑與「青象牌」兩種。

(西螺鎮示範田裡生長良好的新種油菜)

甘藷

苗的

速成

培育

— 茂 忠 方 —

八七水災後，甘藷苗的供應非常缺乏。下面介紹福建閩東地區的甘藷苗速成育成法，以供農友參考。

選地 選擇灌溉排水便利，較爲肥沃的砂壤土，做爲苗床。


整地 每十公畝（一分地）伏苗八千株左右。每二公尺寬作平畦苗床，畦間留三十公分溝，做爲通路，每畦開四條植溝伏苗，溝距（行距）五十分，苗間距離二十公分。

施肥 每分地施用腐熟堆肥一千五百至二千公斤，過磷酸石灰二十公斤，氯化鉀十五公斤，作爲基肥。每次剪苗後，再施用適量稀薄水肥或硫酸銨，以促進生育。第四次後，應加用草木灰等其他肥料。

伏苗 選擇無病強健的先端苗爲種苗。在傍晚，照上述距離排在植溝，苗端方向一致，三、四節入土作船底形，五、六節伸出土面。蓋土後略壓，覆土二寸左右。

管理 ① 摘心：活渣後二、三天，自頂端摘去，留基部三、四節使發腋芽。② 肥培：活着一週後，施第一次追肥，並稍中耕培土。③ 灌排水：苗床土壤應保持濕潤，不可過乾，也不可積水。④ 病蟲害防治：照本省現行辦法防治。縮芽病苗要拔除。

採苗 苗長一尺多不到二尺時，就可剪採甘藷苗，第一次約在伏苗後半個月採苗，以後，每週或每五、六天採一次。可連續採苗七、八次以上。自第二、三次以後，每次所採苗，可供一公頃以上本圃打插之用。採苗時應注意：① 採用先端苗，最多二段苗，基部苗不用。② 每次採苗，都留二、三節或三、四節使再發新苗。③ 每百條苗紮成一束，以便計算。二段苗不可超過百分之五。④ 採苗時，注意不要踩壞苗。⑤ 諸苗已成，自己不用時，應採售。留得過長，會影響再發新苗。
殘株利用 採完甘藷苗後，仍可施用混合肥料，培土，再經一兩個月，收穫五六百公斤小甘藷。



(每畦開四條溝)

